

DESCRIPTION D'UN FULGORIDE NOUVEAU DU MONT
SINAÏ.

Par le Dr. G. HORVÁTH.

(Avec une figure.)

Moysella nov. gen.

Corpus latum, depresso. Caput transversum, obtusissimum, haud productum, pronoto distinete angustius. apice late rotundatum, basi rotundato-sinuatum; vertice brevissimo, sulcum angustum, transversum, arcuatum mentiente, marginibus antico et postico parallelis; fronte convexa, jam a supero bene distinguenda, subquadrata, ubique fere æque lata, haud carinata, marginibus lateralis laminato-dilatatis; ocello frontali nullo: clypeo cum fronte confluente, carina mediana destituto, lateribus autem carinatis; scrobibus antennarum subtus et postice carina laminiformi curvata circumdati. Oculi parvi, globosi. Ocelli minimi, obsoleti. Antennæ infra oculos insertæ, articulo secundo parvo, subgloboso. Rostrum pone coxas posticas extensum. Pronotum breve, postice angulato-emarginatum, tricarinatum, utrinque pone oculos area elevata, extus et postice carina arcuata terminata instructum, marginibus lateralibus laminato-dilatatis. Mesonotum magnum, haud carinatum. Elytra apicem abdominis distinete superantia, ampla, apice obtuse rotundata, marginibus lateralibus subparallelis, basin versus fortiter rotundato-ampliatis et versus medium leviter sinuatis, venis crassiusculis, granulis setigeris destitutis, vena costali incrassata, per totam longitudinem distinete depressa et leviter reflexa, vena radiali et vena mediana basin versus in unam conjunctis et e truncu communi emergentibus, vena radiali et vena cubitali ante medium furcatis, omnibus postice ramosis. Pedes mediocres, simplices; femoribus et tibiis omnibus inermibus, tibiis anticis femoribus anticis brevioribus.



Fig. 1.

Moysella sinaitica n. sp.

Ce genre de Fulgorides, de la sous-famille des *Lixiinae*, est des plus remarquables et ne ressemble à aucun autre par la structure singulière de la tête et du pronotum et par la forte nervure costale aplatie et un peu réfléchie.

Moysella sinaitica n. sp.

Tota flavo-testacea, lœvigata, subnitida, glabra, cum elytris tantum $\frac{3}{4}$ longior quam latior; capite et pronoto a supero visis longitudine subæqualibus; vertice retrorsum declivi, longitudine sua saltem octuplo latiore; fronte convexa, lateribus dilatatis extus arcuatis, extrorsum et nonnihil antrorsum productis; pronoto capite fere duplo latiore; mesonoto convexo, apice distincte depresso; elytris duplo longioribus quam latioribus, hyalinis, testaceo- vel interdum fusco-venosis. ♂. ♀. Long. corp. $5\frac{1}{2}$ —6, cum elytris $6\frac{1}{4}$ —7 mill.

Mont Sinaï: Plateau d'Edom. (Musée Nat. Hongrois et Coll. ROYER.)

C'est à mon ami le Dr. MAURICE ROYER que je dois la communication de ce curieux Insecte.
