Description d'une nouvelle espèce de *Bursinia* de Tunisie

(*Hemipt. Folgoridæ*)

par Ernest de Bergevin

Bursinia laticeps n. sp.

♂ Corps ovale. Tête uniformément d'un testacé grisâtre clair; appendice céphalique épais et relativement court mesurant 1m/m7 de l'appex à la base, un peu plus large au sommet (0m/m75 au sommet, 0m/m64 à la base); insensiblement courbé à l'apex, muni d'une carène médiane un peu plus saillante au sommet et à la base que vers le milieu; de plus, vus d'en haut, les bords, surtout au sommet, forment une légère expansion et constituent une étroite bordure ailée dont la tranche s'involute en bourrelet latéral.

Vue de profil, la plage qui s'étend en avant de l'œil prend la forme d'un triangle allongé, presque aigu, par suite de la direction oblique de la carène céphalique suboculaire, qui vient mourir un peu avant le sommet de l'appendice, laissant ainsi la plage gagner étroitement l'apex entre son bord latéral et l'extrémité de cette carène. Cette plage est confusément ponctuée de brun clair sur toute sa surface. La partie qui descend le long de l'œil est parsemée, par contre, de quelques points bien nets d'un brun noir. Cette ponctuation foncée se retrouve sur les carènes de l'appendice et sur les bords internes du scrobe, dont le fond est immaculé et testacé clair comme le reste de la tête; les deux premiers articles des antennes sont bruns, le deuxième est parsemé de quelques points ocellés, les autres articles sont d'un noir franc.

Front de même couleur que l'appendice, sans points bruns ; clypéus un peu plus clair et strié obliquement de raies brunes. Ocelles à peine distincts.

Pronotum à selle médiane fortement tricarénée, muni, principalement sur les côtés, de gros points enfoncés à fond concolore mais à bordure brune; de couleur uniformément testacée.

Mésonotum fortement tricaréné, testacé blanchâtre, obscurément parsemé de petits points bruns.

Elytres très finement aciculés, munis aux épaules de deux grosses taches noires qui en occupent presque toute la base, à l'exception du bord externe, et envahissent la première moitié de l'élytre. La seconde moitié

est d'un blanc laiteux, sauf une bande noire assez large qui borde le sommet. De sorte que ces élytres paraissent, en réalité, noires avec une large fascie blanchâtre au milieu. La nervation est coucolore, c'est-à-dire noire ou blanchâtre suivant les parties de l'élytre qu'elle traverse.

Tergites abdominaux gris testacé, très confusément mouchetés de brun.

Propleures testacé rougeâtre, obscurément mouchetés de brun sur le disque, très nettement ponctués de brun foncé sur la marge externe.

Pattes testacé blanchâtre mouchetées de taches brunes, surtout sur les fémurs et les tibias postérieurs, ceux-ci pourvus de cinq épines noires à base blanche.

♀ Corps largement ovale. Tête testacé verdâtre; appendice céphalique (fig 2), plus fort, plus long, plus élargi que chez le mâle; longueur 1m/m82,



Fig. 1 et 2. — *Bursinia laticeps* n. sp. 1, appendice céphalique d'un individu femelle, vu de profil. 2. Tête et thorax vus de dessus.

largeur 0m/m80 au sommet, 0m/m66 à la base, un peu spathuliforme avec expansion latérale en bordure ailée, plus apparente que chez le mâle. Le rebord latéral semé de gros points noirs groupés en ligne ça et là. Forte carène médiane, un peu plus saillante au sommet et à la base que vers le milieu.

Vue de profil, la plage latérale (Fig. 1) a le même aspect que chez le mâle, toutefois les mouchetures brunes y sont plus régulières et plus

apparentes. Ces mouchetures envahissent le fond du scrobe, les joues, le front et le clypéus, qui est, comme chez le mâle, obliquement strié de brun. Toutes ces pièces céphaliques ont la même coloration que l'appendice, sauf le clypéus un peu plus clair.

Antenne de même coloration dans les deux sexes, ocelles à peine distincts.

Pronotum de même couleur que la tête, selle médiane fortement tricarénée, les deux carènes externes munies chacune de cinq gros points noirs enfoncés, cinq autres points noirs superficiels et beaucoup plus petits de part et d'autre de la carène médiane. Les deux triangles latéraux avec de gros points enfoncés, concolores, sauf sur le bord basal où ils sont noirs.

Mésonotum jaunâtre clair, tricaréné orné d'une fine ligne noire sur le bord postérieur. Parties extérieures aux carènes ponctuées de noir, le disque parsemé de points plus clairs et plus petits.

Elytres d'un testacé grisâtre uniforme, avec nervation concolore.

Tergites abdominaux d'un testacé plus clair, rembrunis sur les côtés avec abondante ponctuation brune. Carène médiane des 4 premiers tergites brun de poix.

Propleures d'un jaune rougeâtre, ponctués de brun; cette ponctuation est un peu plus dense sur le pourtour, le bord interne, sous le scrobe, est brun foncé.

Pattes d'un testacé clair. Fémurs antérieurs et médians légèrement canaliculés avec des taches en ligne d'un brun noir, dans ces canalicules. Tibias des membres antérieurs plus foncés. Fémurs et tibias postérieurs parsemés de taches brun clair, armés de sept épines noires.

Longueur totale 6m/m62, largeur 3m/m09.

Types: 3 ♂ dont deux immatures et 4 ♀ dont deux immatures; ma collection. Les affinités de cette espèce la rapprochent du *Bursinia socors* Horv. d'une part, et de *Bursinia Bouvieri* Bergev. d'autre part

Elle diffère de l'une et de l'autre par ses dimensions plus fortes; de *B. socors* par son appendice céphalique dilaté et explané au sommet surtout chez la femelle; de *B. Bouvieri* par son appendice beaucoup plus long et à courbure apicale atténuée: cet organe est brusquement coudé au sommet chez cette dernière espèce. La plage antéoculaire est de forme différente, beaucoup plus allongée et plus aigue dans *B. laticeps* que dans les deux autres espèces.

Il y a lieu, en outre, de remarquer que *B. socors* mâle diffère des deux autres espèces par sa coloration beaucoup plus claire. On n'y voit pas le large bande noire qui occupe la moitié basilaire des élytres de *Bursinia*

Bouvieri et *laticeps*, non plus que la ligne de même couleur qui en orne l'extrémité, ni la fascie blanche médiane.

Or, j'ai constaté que cette coloration des mâles dans chacune de ces espèces est respectivement très constante, même chez les individus immatures où elle est très nettement indiquée.

On pourrait placer *B. socors* entre les deux espèces, *B. laticeps* représentant l'expression la plus élevée du groupe.

J'ai capturé cette espèce le 26 juillet 1913, au lieu dit le Roui-Guiba, à une altitude variant entre quatre et cinq cents mètres, dans le massif du Djebel Baten-Icrem, derrière le Djebel Mounchar, à 30 kilomètres Nord-Est de Béja (Tunisie).

Je rappelle en terminant que, dans le n° 1 de ce *Bulletin*, du 15 janvier 1912, j'avais donné la liste des espèces et variétés alors connues du genre *Bursinia*. Les espèces étaient au nombre de 6, dont 4 algériennes. Depuis, le nombre de nos espèces Nord-Africaines s'est accru de deux unités : *Bursinia Bouvieri*, décrit dans le n° 15 de cette année du *Bulletin de la Société entomologique de France*, et *B. laticeps* qui fait l'objet de cette communication.

Une nouvelle fourmi parasite

par le Dr Santschi

Wheeleriella adulatrix n. sp.

Longueur 3,6 mill. Noire. Mandibules, lobes frontaux, funicule moins le premier article, tarses et articulation des pattes brun roussâtre. Submate. Tête plus mate, dos du thorax et gastre plus luisants. Mandibules lisses. Bord antérieur de l'épistome un peu échancré devant. Tête distinctement plus longue que large. Epaisseur de la protubérance mésonotale un peu plus faible que la hauteur du pronotum devant (plus épaisse chez *Santschii* For.). Deuxième article du pédicule un peu plus étroit, ainsi que le gastre. Pour le reste comme chez *W. Santschii*.

Kairouan, 22 octobre 1913. Une femelle en arrêt sur un nid de *Monomorium Salomonis* L. st. *subnitidum* Em.

Très voisine de *W. Santschii* For., cette espèce s'en distingue à première vue par les mêmes caractères de couleur et de taille que ceux qui