http://www.biodiversitylibrary.org/

Boletin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales.
Zaragoza :Libreria Editorial de Cecilio Gasca,1902-1918.
http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/69250

t.2 (1903): http://www.biodiversitylibrary.org/item/173714

Article/Chapter Title: Excursion del dia 27 de Octubre de 1903
Author(s): De Acha, M. A.
Subject(s): Hemiptera
Page(s): Page 269, Page 270, Page 271, Page 272, Page 273

Contributed by: Smithsonian Libraries
Sponsored by: Biodiversity Heritage Library

Generated 21 March 2017 7:27 AM
http://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/063130900173714

This page intentionally left blank.

EXCURSIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 1903

POR D. MANUEL ARDID DE ACHA

Terminadas las alegres fiestas del Pilar, vueltos á sus hogares los que por unos días fueron nuestros huéspedes, recobrado el aspecto normal de la ciudad y entregados sus laboriosos habitantes á las cotidianas ocupaciones, esta SOCIEDAD no podía estar inactiva, ya que un tiempo primaveral la brindaba á inaugurar sus excursiones de otoño, época la más propicia para sorprender á los insectos en sus últimas transformaciones ó en su pleno desarrollo antes que los fríos del invierno les hicieran buscar sus guaridas en los troncos de los árboles, las quebradas de las peñas ó en las hojas desprendidas y hacinadas por el viento.

Se improvisó, puede decirse, la excursión y esto fué causa de que la concurrencia no fuese tan numerosa como en otras ocasiones pues la formaron solamente, los señores Bovio, P. Navás, Silván y el que estas líneas suscribe. A ellos luego se agregaron tres jóvenes entusiastas que no pertenecen á la SOCIEDAD. Indecisos estuvieron los expedicionarios antes de resolverse á salir al campo; y en poco estuvo que no se suspendiera la excursión. Un inmenso nublado que cubría el horizonte amenazaba resolverse en copiosa lluvia y aguar la fiesta en sus comienzos; pero el entusiasmo por la ciencia y el deseo de esparcir el ánimo en el campo, después de tantos días de fiesta, triunfaron de aquel temor y la alegre comitiva dirigióse al agreste y pintoresco Soto de Almozara, á orillas del Ebro, lugar elegido y el más á propósito por su situación y condiciones de vegetación para esta clase de excursiones. A nuestra llegada tuvimos ocasión de presenciar las maniobras que el Regimiento de Pontoneros estaba haciendo sobre el Ebro, lo cual, á la vez que nos distrajo breves momentos, contribuyó á proporcionarnos el descanso necesario para emprender nuestra tarea predilecta, objeto de la expedición.

Toda la orilla derecha del río fué explorada en una gran extensión, lo mismo que las arboledas cercanas, y los trabajos de todos viéronse coronados con un éxito bastante lisonjero, pues recogiéronse buenas especies de insectos de todos los órdenes y no pocos moluscos terrestres de varias especies.

Serían las cinco de la tarde cuando principió el regreso, y cualquiera que nos hubiese obseryado á la llegada, hubiera podido comprender por nuestra animada conversación y expansiva alegría, que tan agradable excursión nos había proporcionado la doble satisfacción de instruirnos al par que recrearnos.

Como por premuras de tiempo y estar en estudio, no pudieron ser clasificados oportunamente varios ejemplares recogidos en excursiones anteriores, inclúyense en la relación de la presente todos aquellos que no lo fueron anteriormente y que proceden del término de Zaragoza. Pero esta vez, haciendo caso omiso de otros órdenes, se pondrá la enumeración de los Hemípteros hallados en varias excursiones. Muchos de ellos figuran en mi colección, los demás en las otras de Zaragoza.

HEMÍPTEROS DE LOS ALREDEDORES DE ZARAGOZA

Escuteléridos

Psacasta exanthematica, Scop.
Eurygaster maura, L.
— *hottentota,* H. S.
— *maroccana,* Fabr.
Tarisa flavescens, Am.
Ancyrosoma albolineatum, Fab.
Graphosoma semipunctatum, F.
— *lineatum,* L.
Podops inuncta, Fab.

Pentatómidos

Brachypelta aterrima, Först.
Sehirus dubius, Scop.
Sciocoris Helferi, Fieb.
Ælia acuminata, L.
— *Germari,* Kust. var. *cognata,* Fieb.
Neottiglossa leporina, H. S.
Eusarcoris inconspicuus, H. S.
Peribalus distinctus, Fieb.
— *sphacelatus,* F.
Carpocoris fuscispinus, Boh.
— *nigricornis,* F.
— *lynx,* Fabr.
— *baccarum,* L.
— *varius,* F. var. *lunula,* Fab.

Palomena viridissima, Poda.
— *prasina*, L.
Brachynema cinctum, Fab.
— *virens*, Kl.
Nezara viridula, L.
— — var. *torquata*, F.
Piezodorus incarnatus, Germ.
Raphigaster grisea, Fab.
Tropicoris rufipes, L.
Eurydema ornatum, L.
— *festivum*, L.
— — var. *picta*, H. S.
Eurydema decoratum, H. S.
— *oleraceum*, L.

Coreidos

Phyllomorpha laciniata, Vill.
Enoplops scapha, F.
— *cornuta*, H. S.
Syromastes marginatus, L.
Verlusia rhombea, L.
— *sulcicornis*, F.
Gonocerus insidiator, Fabr.
Pseudophlœus Waltli, H. S.
Ceraleptus gracilicornis, H. S.
Bothrostethus annulipes, Costa.
Coreus denticulatus, Scop.
Micrelytra fossularum, Rossi.
Camptopus lateralis, Ger.
Stenocephalus neglectus, H. S.
Therapha hyoscyami, L.
Corizus crassicoruis, L.
— — var. *abutilon* Rossi.
Corizus capitatus, Fab.
— *distinctus*, Fieb.
— *parumpunctatus*, Schill.
Maecevethus errans, Fab.
Chhrosoma Schillingi, Schml.

Ligeidos

Lygœus familiaris, F.
— *equestris*, L.
— *saxatilis*, Scop.
— *militaris*, F.
— *apuanus*, Rossi.
— *punctatoguttatus*, F.
Geocoris lineola, Ramb.
Microplax interrupta, Fieb.
Metopoplax ditomoides, Costa.
Oxycarenus lavateræ, F.
— *roseus*, Leth.
Calyptonotus Rolandri, L.
Aphanus quadratus, F.
— *pini*, L.
Beosus luscus, Fab.
Emblethis verbasci, Fab.
Gonianotus marginepunctatus, Wlf.
Pyrrhocoris ægyptius, L.
— *apterus*, L.

Tingídidos

Tingis pyri, Fab.
Eurycera clavicornis, Fourc.
Monanthia angusticollis, H. S.
— *Kiesenwetteri*, M. R.
— *Wolfii*, Fieb.

Fimátidos

Phymata crassipes, Fab.
— *monstrosa*, F.

Hidrométridos

Hydrometra stagnorum, L.
Velia currens, F.

Gerris paludum, Fab.
— *lacustris*, L.

Redúvidos

Ploiaria culiciformis de G.
Cerascopus domesticus, Scop.
Oncocephalus squalidus, Rossi.
— *notatus*, Kl.
Reduvius personatus, L.
Pirates hybridus, Scop.
Harpactor lividigaster, M. R.
— *iracundus*, Poda.
Coranus ægyptius, F.
Nabis major, Costa.
— *ferus*, L.
— *viridulus*, Spin.

Sáldidos

Salda saltatoria, L.
Leptopus echinops, Duf.

Cimícidos

Ceratocombus coleoptratus, Zett
Cimex lectularius, L.
Piezostethus galactinus, Fieb.
Triphleps nigra, Wolf.

Cápsidos

Miris lævigatus, L.
— *holsatus*, Fab.
Megalocerœa erratica, L.
Miridius quadrivirgatus, Costa.
Calocoris chenopodii, Fall.
— *instabilis*, Fieb.
— *vandalicus*, Rossi.
— *seticornis*, F.
— *roseomaculatus* de G.
— *marginellus*, Fab.
Lygus pratensis, Fab.
Lygus campestris, Fab.
Capsus scutellaris, F.
Conostethus roseus, Fall.
Pachyxiphus cœsareus, Reut.

Naucóridos

Naucoris cimicoides, Lin.

Népidos

Nepa cinerea, L.
Ranatra linearis, L.

Notonéctidos

Notonecta glauca, L.

Cicádidos

Tettigia orni, L.
Cicada plebeja, Scop.
Tibicina nigronervosa, Fieb.
— *hæmatodes*, Scop.

Fulgóridos

Cixius nervosus, L.
Almana longipes, Duf.
— *hemiptera*, Costa.
Dictyophora europœa, L.
Hysteropterum liliimacula, Costa
— *grylloides*, Fab.
— *impressum*, Fieb.
Kelisia guttula, Germ.
Delphax brevipennis, Boh.
Tettigometra virescens, Pz.
— *brachycephala*, F
— *fasciata*, Fieb.

Cercópidos

Triecphora sanguinolenta, L.
Lepyronia coleoptrata, L.
Aphrophora corticea Fab.

Ptyelus campestris, Fall.
— *spumarius*, L.

Membrácidos

Centrotus cornutus, L.

Jásidos

Ulopa reticulata, Fab.
Agallia sinuata, Mls.
— *reticulata*, H. S.
Agallia venosa, Fall.
Tettigonia viridis, L.
Eupelix cuspidata, Fab.
Acocephalus striatus, Fab.
— *carinatus*, Stal.
Selenonephalus obsoletus, Germ.
Cicadula sexnotata, Fall.
Phlepsius intricatus, H. S.
Thammotettix fenestratus, H. S.
Chlorita flavescens, Fab.

ESPECIE NUEVA DEL GÉNERO HIPPOCREPIS

POR D. CARLOS PAU

Con motivo de fijar la *Hippocrepis* leñosa de Cartagena, tuve necesidad de revisar las muestras de mi colección; de tal estudio deduzco que los autores castellanos tomaron por *H. scabra* una forma bastante diferente del tipo comunicado por Lagasca y descrito por De Candolle. Esta equivocación fué causa de que Scheele tomara por la especie típica candolleana la planta del centro de España y como especie diversa y nueva la del reino de Murcia. A esta la dió el nombre de *H. Willkommiana*.

Lagasca recogió la *scabra* en las cercanías de Murcia; luego esta es su localidad clásica. Y este mismo vegetal se encuentra en mi colección de Orihuela (Alicante), Pau: Cartagena (Ibáñez, Jiménez y Pau), Almería (Pau) y otros de la Frontera (Reuter).

No conozco muestra de las cercanías de Murcia, pero todos mis ejemplares son iguales á los de Cartagena, localidad clásica de la *H. Willkommiana* Scheele y diversos de los recogidos por mí en el Cerro Negro (Madrid) el 13 de Mayo del 1897, y el que tomo por tipo de la especie nueva que aquí describo.