

SPECIES GENERIS OMMATIDIOTUS SPIN.

disposuit Dr. G. HORVÁTH.

Species generis *Ommatidiotus* SPIN. (e fam. Fulgoridarum) partem meridionalem regionis palearcticæ inhabitant et loca graminosa arida diligunt; species tantum unica (*O. dissimilis* FALL.) Europæ septentrio-nalis et mediæ est incola, ubi in locis paludosis degit.

Imagines, plerumque brachypteræ, apud nos a mense Junio usque ad Octobrem occurunt. Copulationem sexuum mensibus Junio et Julio observavi; nymphas mense Augusto legi. Forma macraptera. specierum hucusque quatuor (*O. longicipitis* PUT., *Falléni* STÅL, *inconspicui* STÅL et *dissimilis* FALL.) cognita, raro vel rarissime invenitur.

MARES.

- 1 (10). Vertice antrorum distincte producto, parte anteculari quam parte interoculari longiore vel saltem æquialonga; fronte latitudine sua longiore, antice parabolica, sed utrinque haud angulata.
- 2 (3). Vertice valde producto, parte anteculari parte inter oculos plus quam duplo longiore, nigricante; fronte duplo longiore quam latiore; homelytris fere totis pallidis, tantum vena costali nigra. *O. acutus* n. sp.
- 3 (2). Vertice minus producto, parte anteculari parte interoculari minus quam duplo longiore, pallido; fronte latitudine sua minus quam duplo longiore; homelytris extus late nigro-limbatis.
- 4 (9). Parte anteculari verticis parte interoculari longiore; homelytris lineis rubris destitutis.
- 5 (6). Fronto medio et apice inter carinas laterales late flavo-testacea; limbo costali nigro homelytrorum quam parte interna albido-testacea haud latiore, area interna corii tota pallida. — — — *O. iranicus* n. sp.
- 6 (5). Fronto tota vel fere tota nigra, medio haud vel tantum angustissime flavo-lineata; limbo costali nigro homelytrorum quam parte interna albida distincte latiore, corio toto nigro.
- 7 (8). Parte anteculari verticis triangulari, lateribus rectis. *O. viduus* n. sp.
- 8 (7). Parte anteculari verticis anguste parabolica, lateribus leviter arcuatis.
O. longiceps PUT
- 9 (4). Partibus anteculari et interoculari verticis æquialongis; homelytris lineis longitudinalibus rubris ornatis. — — — *O. concinnus* n. sp.
- 10 (1). Vertice parum producto, latitudine sua interoculari breviore; fronte

latitudine sua haud longiore, antice subtruncata et utrinque obtuse angulata.

- 11 (14). Vertice antice rotundato, parte anteoculari parti inter oculos æquilonga vel subbreviore; fronte æquilonga ac lata, a latere visa subrecta vel levissime convexa et cum vertice angulum acutum formante.
 12 (13). Homelytris extus late nigro-limbatis; fronte nigra. *O. Falléni* STÅL.
 13 (12). Homelytris medio nigro-vittatis, rarissime totis pallidis et vitta nigra destitutis, limbo costali semper pallido; fronte medio inter carinas internas albida. — — — — — *O. inconspicuus* STÅL.
 14 (11). Vertice antice obtusissime angulato, parte anteoculari parte interoculari $\frac{1}{4}$ breviore; fronte paullo latiore quam longiore, a latere visa sat convexa et cum vertice angulum rectum formante; limbo costali homelytrorum nigro. — — — — — *O. dissimilis* FALL.

FEMINÆ.

- 1 (12). Vertice antrorsum distinete producto, parte anteoculari parte interoculari longiore, parabolica; fronte latitudine sua longiore vel saltem æquilonga, antice parabolica, sed utrinque haud angulata, a latere visa recta, subrecta vel tantum apicem versus levissime convexa et cum vertice angulum magis minusve acutum formante.
 2 (3). Parte anteoculari verticis parte inter oculos fere triplo longiore, elongato-triangulari, lateribus rectis. — — — — *O. acutus* n. sp.
 3 (2). Parte anteoculari verticis parte interoculari haud vel paullo plus quam duplo longiore, parabolica, lateribus arcuatis.
 4 (9). Vertice latitudine sua longiore, parte anteoculari parte interoculari plus quam dimidio longiore; fronte latitudine sua longiore.
 5 (8). Homelytris lineis vel vittis rubris destitutis; parte anteoculari verticis parte interoculari saltem duplo longiore.
 6 (7). Parte anteoculari verticis parte inter oculos paullo plus quam duplo longiore; fronte $\frac{2}{5}$ longiore quam latiore. — — *O. longiceps* PUT.
 7 (6). Parte anteoculari verticis parte interoculari duplo longiore; fronte latitudine sua paullo longiore. — — — — *O. iranicus* n. sp.
 8 (5). Homelytris lineis longitudinalibus rubris ornatis; parte anteoculari verticis parte inter oculos $\frac{4}{5}$ longiore. — — *O. concinnus* n. sp.
 9 (4). Vertice latitudini suæ æquilonga vel subbreviore, parte anteoculari parte inter oculos $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ longiore; fronte æquilonga ac lata.
 10 (11). Fronto vitta media percurrente, supra clypeum plus minusve dilatata et in clypeo continuata, flavo-albida signata; vertice, pro- et mesonoto f. brach. vitta mediana fulva vel rubra notatis; homelytris f. macr. pellucidis, decoloribus. — — — — *O. Falléni* STÅL.
 O. longiceps PUT. var. *decipiens* m.
 11 (10). Fronto macula media magna triangulari albida notata; vertice, pro- et mesonoto f. brach. medio nigro-vittatis; homelytris f. macr. infuscatis. — — — — *O. inconspicuus* STÅL.

- 12 (1). Vertice parum producto, parte anteoculari parte inter oculos $\frac{1}{3}$ breviore, antice obtusissime angulata; fronte latitudine sua paullo breviore, antice subtruncata et utrinque obtuse angulata, a latere visa sat convexa et cum vertice angulum rectum formante.

O. dissimilis FALL.

1. *Ommatidiotus acutus* n. sp.

♂. *Brachypterus*, supra albido-testaceus, subtus niger; vertice antrorum valde producto, latitudine sua interoculari $\frac{4}{5}$ et quam pronoto $3\frac{3}{4}$ longiore, parte anteoculari parte interoculari duplo et $\frac{2}{5}$ longiore, nigricante, elongato-triangulari, lateribus rectis, apice ipso obtuso. parte basali linea mediana rubra in pro- et mesonoto continuata ornata; fronte latitudine sua duplo longiore, antice elongato-triangulari, a latere visa recta, apicem versus levissime convexa et cum vertice angulum acutum formante, nigra, carinis media et duabus lateralibus plus minusve pallidis; genis apice imo albidis; pronoto triplo latiore quam longiore; mesonoto pronoto duplo et dimidio longiore; homelytris subcoriaceis, paullo pone apicem abdominis extensis, vena suturali distincte lineisque tribus inter venas longitudinales obsolete aurantiacis, vena costali nigra; femoribus nigris, tibiis et tarsis flavo-testaceis, tibiis anterioribus basin versus, tibiis posticis fere totis (triente apicali excepto) apiceque tarsorum nigricantibus vel nigro-fuscis. Long. $4\frac{3}{4}$ —5 mill.

♀. *Brachyptera*, flavo-testacea; vertice, pro- et mesonoto linea mediana rubra ornatis; vertice antrorum valde producto, latitudine sua inter oculos $\frac{3}{4}$ et pronoto paullo plus quam quadruplo longiore, parte anteoculari parte interoculari fere triplo longiore, elongato-triangulari, lateribus rectis, apice ipso obtuso; fronte $\frac{2}{3}$ longiore quam latiore, apice elongato-triangulari, a latere visa recta, apicem versus levissime convexa et cum vertice angulum acutum formante, utrinque versus latera nigro-fusca, medio cum carinis lateralibus pallidiore; clypeo fusco-testaceo, medio flavo-vittato; pronoto triplo et dimidio latiore quam longiore; homelytris apicem abdominis sat superantibus, subpellucidis, testaceovenosis, venis longitudinalibus apice nonnihil infuscatis, vena suturali clavi aurantiaca; pectore et femoribus fuscescentibus, tibiis et tarsis pallidis, his apice nigricantibus; abdomine fere toto nigro. Long. 7 mill.

Mongolia : Iro ! (Mus. Hung. et Coll. MELICHAR.)

2. *Ommatidiotus iranicus* n. sp.

♂. *Brachypterus*, superne albido-testaceus, subtus niger; linea mediana verticis, pro- et mesonoti rubra; vertice antrorum producto,

latitudine sua inter oculos dimidio et pronoto paullo plus quam triplo longiore, parabolico, parte anteoculari parte interoculari dimidio longiore, lateribus leviter arcuatis; fronte nigra, medio et apice inter carinas laterales late flavo-testacea, fere $\frac{1}{8}$ longiore quam latiore, antice parabolica, a latere visa recta et cum vertice angulum acutum formante; sutura inter frontem et clypeum, nec non apice genarum albidis; pronoto longitudine sua triplo latiore; mesonoto pronoto plus quam duplo longiore; homelytris subcoriaceis, apicem abdominis distincte superantibus, vena suturali clavi pallide aurantiaca, vitta costali nigra areas costalem et discoïdalem occupante; femoribus nigris, apice imo horum sicut etiam tibiis et tarsis pallide flavo-testacea, tibiis posticis basin versus leviter infuscatis. Long. 4 $\frac{1}{4}$ mill.

♀. Brachyptera, pallide flavo-testacea; linea mediana verticis, pro- et mesonoti fuscescente, obsoleta; vertice antrorum producto, latitudine sua interoculari $\frac{2}{5}$ et quam pronoto triplo et dimidio longiore, parte anteoculari parte inter oculos duplo longiore, parabolica; fronte levissime infuscata, latitudine sua paullo longiore, antice parabolica, a latere visa recta et cum vertice angulum acutum formante; pronoto longitudine sua media triplo latiore; mesonoto pronoto plus quam duplo longiore; homelytris abdomen distincte longioribus, griseo-hyalinis, subpellucidis, testaceo-venosis, venis apicalibus nonnihil infuscatis; abdomen nigro-variegato. Long. 5 $\frac{1}{8}$ mill.

Persia meridionalis: Enarik-Tamin! (Coll. MELICHAR.)

3. *Ommatidiotus viduus* n. sp.

♂. Brachypterus, supra albido-testaceus, subtus niger; linea media percurrente verticis, pro- et mesonoti rubra; vertice sat producto, latitudine sua interoculari $\frac{1}{8}$ et pronoto triplo longiore, parte anteoculari parte inter oculos paullo plus quam dimidio longiore, trianguli, apice ipso obtusa, lateribus rectis; facie, apice imo genarum excepto, tota nigra; fronte $\frac{1}{8}$ longiore quam latiore, antice parabolica, a latere visa subrecta et cum vertice angulum minus acutum formante; pronoto longitudine sua media triplo latiore; mesonoto pronoto duplo longiore, carinis lateralibus aurantiacis, angulis lateralibus nigris; homelytris coriaceis, apicem abdominis paullo superantibus, corio toto, parte basali exteriore clavi et membrana (parte suturali interna excepta) nigris, clavo anguste flavo-vittato, vena suturali aurantiaca; pedibus nigris, apice tibiarum et tarsis flavo-albidis, his apice leviter infuscatis. Long. 4 mill.

♀. Ignota.

Ommatidiotus Falléni HORV. Term. Füzet. XXIV. p. 485. 151. ♂ (1901).

Syria : Akbes ! (Mus. Madrid.)

Ab *O. Falléni* STÅL vertice magis elongato, lateribus partis antecularis hujus rectis limboque costali nigro homelytrorum quam parte interna albido-testacea distinete latiore bene differt.

4. *Ommatidiotus longiceps* PUT.

♂. Dimorphus, superne albido-testaceus, subtus niger; linea mediana verticis, pro- et mesonoti rubra, s^æpe infuscata. rarissime (f. macr.) nigra; vertice antrorum valde producto, latitudine sua $\frac{3}{5}$ — $\frac{3}{4}$ et pronoto paullo plus quam triplo longiore, parte anteculari parte interoculare $\frac{4}{5}$ vel fere duplo longiore, anguste parabolica, lateribus leviter arcuatis; fronte nigra, dimidio longiore quam latiore, antice parabolica, a latere visa recta vel subrecta et cum vertice angulum acutum formante, carina mediana interdum flavo-testacea; clypeo et genis nigris, harum apice, raro etiam carina media clypei basi flavo-albidis; pronoto fere triplo latiore quam longiore; mesonoto convexo et pronoto saltem triplo longiore (f. macr.) vel plano et pronoto duplo longiore (f. brach.), carinis lateralibus flavis, angulis lateralibus nigris vel nigricantibus; homelytris completis, abdomine $\frac{1}{3}$ longioribus, membranaceis (f. macr.) vel s^æpissime incompletis, abdomine paullo longioribus, subcoriaceis (f. brach.), corio toto, parte basali externa clavi et membrana — parte suturali interna hujus excepta — nigris, vena suturali clavi, in forma macroptera etiam vena costali corii flavescentibus; pedibus nigris, apice tibiarum et tarsis flavo-testaceis, tibiis anticis interdum fere totis pallidis. tarsis apice fuscis. Long. f. macr. $6\frac{3}{4}$, f. brach. $4\frac{1}{4}$ mill.

♀. Brachyptera, flavo-testacea; linea media percurrente verticis, pro- et mesonoti rubra vel fusca; vertice antrorum valde producto, anguste parabolico, latitudine sua $\frac{1}{3}$ et quam pronoto $3\frac{2}{3}$ longiore, parte anteculari parte inter oculos paullo plus quam duplo longiore; fronte fusca, medio flavo-vittata, $\frac{2}{5}$ longiore quam latiore, antice parabolica, a latere visa subrecta et cum vertice angulum acutum formante; clypeo fusco, medio flavo-vittato; pronoto longitudine sua triplo latiore; mesonoto pronoto paullo plus quam duplo longiore, carinis lateralibus flavis; homelytris apicem abdominis paullo superantibus, subpellucidis, griseo-hyalinis, testaceo-venosis; abdomine plus minusve nigro, disco ventris s^æpissime pallido; tarsis apice nigro-fuscis. Long. $5\frac{1}{3}$ — $\frac{3}{4}$ mill.

Ommatidiotus Fallenii BOLIVAR et CHICOTE Anal. de la Soc. Esp. de Hist. Nat. VIII. tab. 3. fig. 9. ♂ et 9a. ♀ (1879).

Ommatidiotus longiceps PUT. Revue d'Ent. XV. p. 265. ♀ (1896).

Hispania : Madrid (BOLIVAR et CHICOTE), Ribas ! (Mus. Hung.), Pozuelo de Calatrava ! (Coll. DE LA FUENTE).

Marem unicum macropterum simul cum maribus et feminis brachypteris in Hispania centrali (Pozuelo de Calatrava, prov. Ciudad Real) legit Dom. J. M. DE LA FUENTE, qui mihi etiam specimen typicum hujus speciei benevole communicavit.

Var. decipiens m. — A typo vertice antrorsum minus producto differt.

♂. Brachypterus; vertice latitudine sua inter oculos $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$ et quam pronoto duplo et dimidio — triplo longiore, parte anteoculari parte interoculari $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ longiore; fronte latitudine sua paullo longiore. Long. $3\frac{3}{4}$ —4 mill.

♀. Brachyptera et in omnibus notis specificis cum femina brachyptera *O. Fulléni* STÅL congruens. Long. $4\frac{3}{4}$ mill.

Hispania : Madrid ! (Coll. MELICHAR), Pozuelo de Calatrava ! (Coll. DE LA FUENTE).

5. *Ommatidiotus concinnus* n. sp.

♂. Brachypterus, supra griseo-albidus, subtus niger; vitta media percurrente verticis, pro- et mesonoti sanguinea; vertice antrorsum sat producto, latitudine sua inter oculos paullo et quam pronoto duplo et $\frac{1}{4}$ longiore, parte anteoculari parti interoculari æquilonga, parabolica; fronte nigra, parum longiore quam latiore, antice rotundata, a latere visa levissime convexa et cum vertice angulum acutum formante; sutura inter frontem et clypeum apiceque genarum albidis; pronoto longitudine sua minus quam triplo latiore; homelytris subcoriaceis, abdomine paullo longioribus, vena suturali et linea media clavi vittaque angusta interna corii rubris, limbo costali nigro, colore hoc nigro aream costalem et partem exteriorem areæ discoidalis corii occupante; suturis angustis pectoris albido-testaceis; femoribus, apice imo excepto. nigris, tibiis et tarsis albidis, illis basin versus, his apice nigris. Long. $3\frac{3}{4}$ — $4\frac{1}{4}$ mill.

♀. Brachyptera, flavo-testacea; linea longitudinali media ab apice verticis usque ad apicem clavæ ducta, vitta clavi vittisque duabus interribus corii aurantiaco-rubris; vertice antrorsum sat producto, latitudine sua interoculari parum, sed quam pronoto duplo et $\frac{1}{3}$ longiore, parte anteoculari parte inter oculos $\frac{4}{5}$ longiore, parabolica; fronte latitudine sua paullo longiore, antice rotundata, a latere visa nonnisi levissime convexa et cum vertice angulum acutum formante, plus minusve infuscata. medio albido-vittata; pronoto fere triplo latiore quam longiore; mesonoto pronoto duplo longiore; homelytris pone apicem abdominis sat longe extensis, hyalinis, pellucidis, rubro-vittatis; corpore subtus magis minusve

infuscato, lateribus ventris nigricantibus; pedibus flavo-testaceis, femoribus interdum nigro-fuscis. Long. $5\frac{1}{4}$ — $5\frac{1}{2}$ mill.

Hungaria centralis: Peszér! (Mus. Hung.)

Species hæc de homelytris in utroque sexu rubro-lineatis vel vittatis facile cognoscitur.

6. Ommatidiotus Falléni Stål.

♂. Brachypterus, superne griseo- vel testaceo-albidus, subtus niger; linea mediana verticis, pro- et mesonoti rubra, rarissime nigra; vertice sat producto, antice rotundato, latitudine sua interoculari paullo breviore et quam pronoto fere duplo longiore, partibus anteoculari et interoculari æquilongis; facie nigra, genis apice albidis, carina media frontis supra clypeum rarissime flavo-albida; fronte æquilonga ac lata, antice subtruncata et utrinque obtuse angulata, a latere visa levissime convexa et cum vertice angulum minus acutum formante; pronoto longitudine sua media triplo latiore; mesonoto pronoto plus quam duplo longiore; homelytris subcoriaceis, abdomine distincte longioribus, extus late nigro-limbatis, limbo hoc nigro areas costalem et discoidalem, interdum etiam partem basalem externam areæ brachialis corii occupante, vena suturali et linea media clavi lineaque interna corii aurantiacis; pedibus nigris, apice tibiarum et tarsis (apice excepto) albido-testaceis. L. $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ mill.

♀. Dimorpha, pallide flavo-testacea; vitta media percurrente verticis nigra (f. macr.) vel fulva, interdum rubra (f. brach.); vertice sat producto, æquilongo ac inter oculos lato vel subbreviore, sed quam pronoto duplo et dimidio longiore, parte anteoculari antice rotundata et quam parte interoculari $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ longiore; fronte æquilonga ac lata, antice obtuse rotundata, a latere visa subrecta et cum vertice angulum acutum formante, nigra vel fusco-nigra, angustissime flavo-marginata et carinata, vitta media percurrente, supra clypeum sæpe plus minusve dilatata et in clypeo nigro continuata flavo-albida signata; pronoto longitudine sua media triplo latiore; mesonoto convexo, pronoto triplo longiore, utrinque prope carinas et angulos laterales nigricante (f. macr.) vel plano, pronoto paullo plus quam duplo longiore, toto pallido (f. brach.); homelytris completis, abdomine fere duplo longioribus, hyalinis, pellucidis (f. macr.) vel sæpiissime incompletis, pone apicem abdominis parum extensis, subcoriaceis, griseo-hyalinis (f. brach.), testaceo-venosis, venis apicalibus leviter infuscatis; pectore et ventre nigris, incisuris anguste pallidis; pedibus flavo-testaceis, femoribus et parte basali tibiarum interdum nigris. Long. f. macr. $5\frac{1}{2}$, f. brach. $4\frac{1}{2}$ —5 mill.

Ommatidiotus Falleni STÅL Stett. Ent. Zeit. XXIV. p. 251. 1. ♀ (1863);
FIEB., Cicad. d'Eur. II. p. 234. 1. ♀ (1876); ? MELICHAR Cicad. Mittel-Eur. p. 37.
1. ♀ (1896).

Rossia meridionalis: Sarepta! (Mus. Holm.); Romania: Comana! (Mus. Hung.); Hungaria: Budapest!, Budafok!, Pomáz!, Duna-Haraszti!, Peszér!, Gyoma!, Simontornya! (Mus. Hung.); Sibiria: Irkutsk! (Coll. MELICHAR); ? Dalmatia: Ragusa (sec. MELICHAR).

Feminas quatuor macropteras in Hungaria centrali (Budapest, Duna-Haraszti, Peszér) simul cum speciminibus brachypteris legit J. UJHELYI.

Specimen typicum (♀) in Museo Holmiensi asservatum examinavi.

7. *Ommatidiotus inconspicuus* STÅL.

♂. Brachypterus, supra pallide flavo- vel albido-testaceus. subtus niger; vitta media percurrente verticis, pro- et mesonoti nigra; vertice antrorum sat producto, latitudine sua subbreviore et pronoto vix plus quam duplo longiore, parte anteoculari parte interoculari subbreviore, antice rotundata; fronte nigra, medio inter carinas internas albida, æquilonga ac lata, antice subtruncata et utrinque obtuse angulata, a latere visa subrecta vel levissime convexa et cum vertice angulum minus acutum formante, carinis lateralibus angustissime flavo-testaceis; sutura inter frontem et clypeum cum apice genarum nigrarum albida; clypeo nigro, albido-carinato; pronoto triplo latiore quam longiore; homelytris subcoriaceis, apicem abdominis distincte superantibus, vitta media nigra, aream discoidalem et sæpiissime etiam aream brachialem corii partemque basalem externam clavi occupante notatis, vitta hac nigra rarissime omnino deficiente; suturis pectoris discoque ventris pallid s; femoribus, apice imo excepto, nigris, tibiis et tarsis flavo-testaceis, illis basin versus, his apice magis minusve infuscatis. Long. $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{8}$ mill.

♀. Dimorpha, flavo-testacea; vitta mediana verticis, pro- et mesonoti nigra; vertice antrorum sat producto, latitudine sua subbreviore et quam pronoto fere duplo et dimidio longiore, parte anteoculari antice rotundata et quam parte inter oculos $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ longiore; fronte æquilonga ac lata, antice rotundata, a latere visa subrecta et cum vertice angulum acutum formante, nigra vel fusco-nigra, albido-carinata et marginata et macula magna media triangulari, a basi usque ad apicem extensa, albida signata; clypeo nigro vel fusco-nigro, testaceo-vittato; pronoto triplo latiore quam longiore; mesonoto convexo, pronoto triplo longiore et utrinque ad angulos laterales nigricante (f. macr.) vel plano, pronoto paullo plus quam duplo longiore, angulis lateralibus pallidis (f. brach.); homelytris completis, abdomine fere duplo longioribus, membranaceis,

infuscatis (f. macr.) vel plerumque incompletis, apicem abdominis paullo superantibus, subcoriaceis, griseo-hyalinis (f. brach.). albido-venosis, venis apicalibus nigricantibus vel fuscis; pectore et ventre plus minusve nigro-variegatis; femoribus interdum nigricantibus. Long. f. macr. $5\frac{1}{4}$. f. brach. $3\frac{3}{4}$ — $4\frac{1}{3}$ mill.

Ommatidiotus inconspicuus STÅL Stett. Ent. Zeit. XXIV. p. 251. 2. ♂ (1863); FIEB. Cicad. d'Eur. II. p. 236. 3. ♂ (1676); MELICHAR Cicad. Mittel-Eur. p. 38. 3. ♂ (1896).

Hungaria: Budapest, Csepel, Budaörs, Rákos-Palota, Göd. Monor, Soroksár, Aporka, Gyón, Peszér (Mus. Hung.).

Feminas nonnullas macropteras simul cum speciminibus brachypteras in Hungaria centrali (Budapest, Csepel, Gyón, Peszér) legimus.

Femina hujus speciei feminæ speciei præcedentis simillima et nonnisi ægre distinguenda: statura nonnihil minore, fronte macula magna triangulari albida notata, disco ventris semper pallido. Femina brachyptera præterea vertice, pro- et mesonoto nigro-vittatis, femina macroptera autem homelytris infuscatis differt.

Specimen typicum (♂) Musei Holmiensis vidi.

8. *Ommatidiotus dissimilis* FALL.

♂. Brachypterus, supra griseo- vel testaceo-albidus, subtus niger; linea mediana verticis, pro- et mesonoti rubra, raro fusco-nigra; vertice antrorsum paullo producto, latitudine sua $\frac{1}{4}$ breviore, sed pronoto minus quam duplo longiore, parte anteculari antice obtusissime angulata et quam parte interoculari $\frac{1}{4}$ breviore; facie — apice genarum anguste flavo-albido excepto — tota nigra; fronte paullo latiore quam longiore, antice subtruncata et utrinque obtuse angulata, a latere visa sat convexa et cum vertice angulum rectum formante; pronoto longitudine sua triplo latiore; mesonoto pronoto duplo longiore; homelytris subcoriaceis, abdome paullo longioribus, extus nigro-limbatis, vena suturali et linea media clavi lineaque interna corii aurantiacis, limbo costali nigro interdum valde dilatato et corium fere totum partemque basalem externam clavi occupante; femoribus nigris, apice imo horum, tibiis et tarsis pallide flavo-testaceis. tibiis basin versus tarsisque apice plus minusve fuscescentibus vel fusco-nigris. Long. $3\frac{1}{4}$ —4 mill.

♀. Dimorpha. flavo-testacea: linea longitudinali media ab apice verticis usque ad apicem clavi ducta, vitta media hujus vittisque duabus interioribus corii fulvis vel aurantiaco-rubris; vertice antrorsum paullo producto, latitudine sua $\frac{1}{4}$ breviore et quam pronoto duplo longiore,

parte anteoculari antice obtusissime angulata et quam parte interoculari fere $\frac{1}{3}$ s breviore; fronte latitudine sua paullo breviore, antice subtruncata et utrinque obtuse angulata, a latere visa sat convexa et cum vertice angulum rectum formante, nigra vel fusca, carinis lateralibus et vitta mediana pallidis; clypeo nigro vel fusco-nigro, medio flavo-vittato; pronoto triplo latiore quam longiore; mesonoto convexo et pronoto triplo longiore (f. macr.) vel plano et pronoto duplo longiore (f. brach.); homelytris completis, abdome fere duplo longioribus, postice hyalinis (f. macr.) vel plerumque incompletis, abdome paullo longioribus, subcoriaceis (f. brach.); corpore subtus fusco- et nigro-variegato; femoribus (apice excepto), saepe etiam tibiis basin versus tarsisque apice nigris. Long. f. macr. $5\frac{1}{2}$, f. brach. $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$ mill.

Issus dissimilis FALL. Vet. Ak. Nya Handl. XXVII. p. 123. 2. ♂ ♀ (1806); Hem. Svec. Cicad. p. 70. 2. ♂ ♀ (1826); GERM., Faun. Ins. Eur. IX. tab. 15. ♂ et 16. ♀ (1817); Ent. Arch. II. 2. p. 52. 21. ♂ ♀ (1830); SAHLB. Not. Sällsk. pro Fauna et Flora Fenn. IX. p. 219. 25. ♀ macr. (1868).

Ommatidiotus dissimilis FLOR Rhynch. Livil. II. p. 94. 1. ♂ ♀ (1861); SAHLB. Finland. Skand. Cicad. p. 393. 1. ♂ ♀ (1871); FIEB. Cicad. d'Eur. II. p. 235. 2. ♂ ♀ (1876); BOLIVAR et CHICOTE Anal. de la Soc. Esp. de Hist. Nat. VIII. tab. 3. fig. 8. (1879); MELICHAR Cicad. Mittel-Eur. p. 38. 2. ♂ ♀, tab. 3. fig. 9—12. ♂ (1896).

Svecia (FALLÉN); Fennia! (Mus. Hung.); Livonia (FLOR); Germania: Sonderburg!, Freschenhausen! (Coll. MELICHAR); Gallia: Gérardmer! (Coll. PUTON); Helvetia: Valesia! (Mus. Holm.); Hungaria: Rákos-Palota! (Mus. Hung.).

Forma macroptera (♀) rarissima, hucusque tantum in Fennia reperta.