

1913

Tiflis Mitt. Kaukus. Mus. 7: 200-202

on computer

- 1 -

1913

Author Card

catalogued

Dr. G. Horváth (Budapest).



HEMIPTÈRES RECUEILLIS

par M. Malcolm Burr en Transcaucasie.

Mon honoreé confrère et ami, M. MALCOLM BURR a bien voulu consacrer quelques moments aussi à la chasse des Hémiptères lors de sa dernière visite au Caucase en été 1912. Avant de traverser la chaîne principale, il a pris le 31 août à Balta près de Vladikavkaz 3 espèces communes: *Palomena prasina* L., *Reduvius lativentris* BOH. et *Aphrophora spumaria* L. (*alni* FALL.).

Ses récoltes faites dans la province d'Elisavetpol (distr. d'Areš) dont il m'a confié l'examen, ont été plus riches. Il y a recueilli du 3 au 15 septembre à Geok-tapa et dans les steppes environnantes les espèces suivantes:

Hétéroptères.

- ✓✓ 1. *Odontotarsus robustus* JAK.
- ✓✓ 2. *Graphosoma semipunctatum* FABR.
- ✓✓ 3. » *italicum* MÜLL.
- ✓✓ 4. *Apodiphus amygdali* GERM.
- ✓✓ 5. *Aclia acuminata* L.
- ✓✓ 6. » *melanota* FIEB.
- ✓✓ 7. *Carpocoris pudicus* PODA (*purpureipennis* DE GEER.).
- ✓✓ 8. *Nezara sahlbergi* REUT. (*satanini* JAK.).
- 9. *Gonocerus acuteangulatus* GOEZE.
- 10. *Centrocoris variegatus* KOL.
- 11. » *volxemi* P'TUT.
- 12. *Camptopus lateralis* GERM.
- 13. *Spilostethus equestris* L.
- 14. *Geocoris megacephalus* ROSSI var. *siculus* FIEB.

(200).

15. *Rhyparochromus praetextatus* H.-Sch.
16. *Beosus quadripunctatus* MüLL.
17. *Emblethis verbasci* FABR.
18. *Callistodemma fasciatum* Kol.
19. *Coranus tuberculifer* REUT.
20. *Adelphocoris vandalicus* Rossi.
21. *Aretocorisa linnei* FIEB.

Homoptères.

22. *Cicadatra burriana* HORV.
23. *Tettigoniella viridis* L.
24. *Macropsis microcephala* H.-Sch.
25. *Dictyophora multireticulata* M. R.
26. > *europaea* L.
27. *Cixius nervosus* L.

Cette liste a bien le caractère général de la faune hémiptérologique de la Transcaucasie; elle comprend surtout des espèces de l'Europe méridionale auxquelles viennent se mélanger quelques représentants des régions transcaspiennes. Ainsi *Aclia melanota* FIEB., *Nezara sahlbergi* REUT., *Centrocoris volvem* PUR. et *Callistodemma fasciatum* Kol. se trouvent aussi en Turcomanie et au Turkestan, mais manquent dans la région méditerranéenne.

La plus intéressante espèce de l'envoi de M. BURR est incontestablement une nouvelle Cigale du genre *Cicadatra* que j'ai décrite sous le nom de *Cicadatra burriana* (Ann. Mus. Hung., X. 1912, p. 606, fig. 7) et dont M. BURR a rapporté un couple. Elle constitue un sous-genre nouveau que j'ai nommé *Rustavelia*, dédié à la mémoire de CHOTA RUSTAVÉLI, célèbre poète géorgien du 12-e siècle et dont je trouve utile de reproduire ici la description.

Subgen. *Rustavelia* HORV.

A gen. *Cicadatra* differt:

Area apicali prima elytrorum rudimentaria, minutissima et quam area postcostali haud vel vix latiore; lobis foliaceis tympana marium tegentibus parvis, ante basin partis mediae segmenti dorsalis primi abdominis haud productis

Cicadatra (Rustavelia) burriana HORV.

Oblonga, pallide virescens, parce argenteosericea, superne nigro-picta; capite antice late rotundato, vertice basin versus vel fere

toto nigro, area apicali inserta longitudine sua duplo latiore, transversim nigro-lineata, fronte tumida, lineis transversis impressis nigris notata, genis, loris et clypeo nigris vel pallidis; pronoto basi longitudine sua media fere triplo latiore, plus minusve nigro-picto, sed linea mediana limboque postico semper pallidis; mesonoto nigro, lineis duabus longitudinalibus, introrsum quadrangulariter dilatatis marginibusque lateralibus cum elevatione apicali pallide virescentibus; elytris latitudine paulo plus quam duplo longioribus, venis virescentibus, in triente apicali fuscis, limbo axillari clavi rufo-testaceo; dorso abdominis nigro, margine postico segmentorum (segmento primo excepto) anguste ferrugineo-testaceo; pedibus pallide virescentibus, femoribus anticis superne et extus nigrovittatis, subtus nigrovittatis, subtus nigro-spinosis, tibiis anticis apice apiceque tarsorum omnium leviter infuscatis.

♂. Operculis pallide virescentibus, mediocribus, margine externo subrectis, obliquis, apice rotundatis, intus distantibus; appendicibus postcoxalibus metastethii anguste triangularibus, acutis et quam coxis posticis subbrevioribus; segmento penultimo plus quam triplo longiore, apice rotundato-truncato; valvula genitali segmento ventrali ultimo paulo longiore; hypopygio a latere viso superne subrecto, parum producto, postice fere recto, inermi; appendicibus membris virilis fusco castaneis, curvatis. Long. corp. 15—16, cum elytris 19—21 mm.

Transcaucasia: Geok-tapa in prov. Elisavetpol, specimina duo mense Septembri 1912 legit M. BURR.

Вып. въ свѣтъ: 12. III. 1913.
Ausgegeben am:

(Sep.-Abdr. a. d. «Mitteil. d. Kaukas. Mus.» Bd. VII).

(Отд. оттискъ изъ „Извѣстій Кавказскаго Музея“, т. VII).

Типографія Канцеляріи Намѣстника Его Императорскаго Величества на Кавказѣ.