



<http://www.biodiversitylibrary.org/>

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-akademiens forhandlingar.

Stockholm :P. A. Norstedt & Söner,

<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/15534>

Arg. 14 (1857): <http://www.biodiversitylibrary.org/item/150443>

Article/Chapter Title: Ny art af Copicerus (Swartz)

Author(s): Stal, Carl

Subject(s): Hemiptera, Fulgoroidea, Auchenorrhyncha, planthoppers,

Delphacidae

Page(s): Page 53

Contributed by: Natural History Museum Library, London

Sponsored by: Natural History Museum Library, London

Generated 15 June 2015 9:27 AM

<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/040192700150443>

This page intentionally left blank.

Entomologiska bidrag. — Studenten C. STÅL hade genom Hr BOHEMAN inlemnadt nedanstående uppsattser:

Ny art af Copicerus (Swartz).

I Vetenskaps-Akademiens Handlingar för år 1802 beskref SWARTZ ett nytt, högst utmärkt Homopterslägte, som han kallade *Copicerus* och hvilket sedan denna tid ej af någon författare varit kändt eller omnämndt, ehuru flera arbeten utkommit öfver Fulgoridæ, till hvilken familj det hörer. Det står närmast *Asiraca* och *Aræopus*, men är lätt skildt från det förra genom de enkla frambenen, från det sednare genom de märkvärdigt bildade antennerna, som äro längre, eller åtminstone lika långa som kroppen. Musei samling har nyligen af detta slägte erhållit en ny art, hvilken jag här beskrifver tillika med den förut kända. Typexemplaret för SWARTZ'S beskrifning finnes på Museum i Upsala.

1. *Copicerus irroratus*. SWARTZ. — Testaceo-albidus; antennis fuscis, articulo secundo medio ad marginem macula parva oblonga dilutiore; tegminibus fuscescente-hyalinis, apicem versus obscurioribus, nervis adhuc obscurius punctatis; pectore, abdomine, annulis 2 apicibusque tiliarum anteriorum tarsisque anterioribus fuscis; femoribus anterioribus fusco-punctatis. ♂. Long. 5 Millim. — Jamaica.

Copicerus irroratus. SWARTZ. Kongl. Vet. Ak. Nya Handlingar. Tom. XXIII. p. 181. Pl. VI. 2. a - f. (1802).

2. *C. Swartzi*. — Testaceo-albidus; macula apicali capitis intraoculari et media frontis, lateribus scutelli et pectoris abdomineque nigris aut nigro-fuscis, hoc subtus latera versus parce testaceo-sparso; antennis (præsertim ad margines et hic illic confluentem) femoribusque anterioribus fusco-punctatis; annulis 2 apicibusque tiliarum anteriorum fuscis; tegminibus hyalinis, apice fuscis (parte fusca oblique terminata), nervis albidis, fusco-punctatis. ♀. Long. 6 Millim. — Rio Janeiro.

Till kännedomen af Phytophaga.

DORYPHORA. ILLIG.

1. *maculatissima*. — Subchalybeo-nigra; capite thoraceque subtilissime punctatis, hic illic punctis majoribus sparsis; elytris basi ampliatis, sordide flavescentibus, remote punctatis, maculis minoribus impunctatis obscure æneis seriatim positis ornatis. Long. 23, Lat. 17 Millim. — Remedios Columbiae.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 14. N:o 2.

