

Genom formeln (1) fås $B = 89^{\circ} 50' 4.''37$ eller dess supplement,
» » (2) » = $89 50 6, 14$ » » »
» ZECHS Tabeller » = $89 50 6, 13$ » » »

De verkliga felen äro således resp. = $14.''08$; $12.''31$; $12.''32$,
hvilket alltför mycket afviker från den precision, som bruket
af tabeller med 7 decimaler bör medföra.»

3. Kort öfversigt af Sveriges *Delphax*-arter.

— Hr BOHEMAN anmälde en af Studenten Hr C. STÅL författad uppsats, af följande innehåll:

»Bland de släkten, som räknas till Fulgoridernas familj, torde knappt något vara mindre noga känt af de flesta författare än släktet *Delphax*. Jag önskade derföre, att detta lilla försök till de svenska, hvilket är nästan detsamma som alla kända, arternas utredning och beskrifning på ett ställe måtte vara till någon nytta. Förut vill jag i korthet genomgå, hvad i ämnet blifvit skrifvet, serdeles med afseende på de svenska arterna. LINNÉ kände ingen hithörande art; först FABRICIUS beskref några sådana och förde dem till *Fulgora*, innan han uppställde sitt genus *Delphax*. I Systema Rhyngothorum upptages här af tio arter, hvaraf likväl fyra bortgå, såsom ej, efter nyare åsigter, hörande dit; af de återstående sex äro tre, hvilka FALLÉN med rätta förenar såsom en art under namnet *dispar*, men de öfriga tre äro goda arter, ehuru den ena, nemligen *minuta*, är något omtvistad. GERMAR för den till sin *lineola*, men jag biträder heldre ZETTERSTEDTS åsigt, enligt hvilken den hör till *guttula*, hvilket namn den får bära, till dess det blifvit utredt, hvilken art FABRICIUS menat. FALLÉN beskriver under *Delphax* fem arter såsom svenska, deribland en ny och en som numera räknas till ett annat släkte; ZETTERSTEDT tillägger en i Sverige förut ej funnen, likväl beskrifven, art. Men det är isynnerhet BOHEMAN, som riktat vår Fauna med hithörande arter. Utj olika afhandlingar be-

skrifver han ej mindre än tjugufem, af hvilka blott en antogs såsom förut känd. Af GERMAR hade likväl två deraf förut blifvit beskrifna, deribland BOHEMANS största och vackraste art. DAHLBOM tillade sedan en, och jag har i förra årgången af denna Öfversigt beskrifvit tre nya arter. Således borde vår Fauna med de fyra för Sverige nya, som i denna afhandling upptagas, räkna fyrtioen arter; men redan GERMAR hade för längesedan gjort den upptäckten, att en art, *D. limbata*, hade en kortvingad form, som han kallat *D. anceps* (= *palliata* BOHEM.), och vid de öfrigas närmare studerande finner man, att flera andra äfven hafva en sådan jemte den långvingade. Vid utarbetandet af denna afhandling har jag lyckats att hos sex arter upptäcka båda formerna, af hvilka hvar och en förut blifvit beskrifven såsom serskildt species, så att vid deras afräkning vår Fauna räknar det ändock ej obetydliga antalet af trettiofem arter.

DELPHAX (FABR.).

1. *Frons unicarinata*.

A. *Caput supra intra oculos visum latitudine longius.*

1. *D. lineola* (GERM.): fusca; thoracis carinis dilutioribus; hemelytris abdomine vix dupplo longioribus, nervis obscurioribus, linea suturali parva nigra ornatis; pedibus sordide flavotestaceis ♂♀. Long. corp. 3—3½, lat. 1½ millim.

D. lineola GERM. Magaz. 3, p. 209, 1. — Ejusd. Faun. Ins. Eur. 7. Tab. 19.

Circa Holmiam passim (Dom. BOHEMAN et ipse). Ostrogothia ad Gusum (Dom. P. F. WAHLBERG).

2. *D. truncatipennis* (BOHEM.): testacea; thoracis lateribus fuscis; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, dilute flavotestaceis, maculis 2 longitudinalibus fuscis ornatis (♂), vel immaculatis (♀); abdomine supra lateribus fuscescentes ♂♀. Long. 3, lat. 1½ millim.

D. truncatipennis BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 266, 12. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 46, 15.

In Gottlandia et circa Holmiam passim frequens (Dom. BOHEMAN et ipse).

3. *D. smaragdula* (STÅL): dilute flavovirescens; thorace medio longitudinaliter pallide flavotestaceo; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, testaceo-hyalinis; antennis pedibusque dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis ♀. Long. 4½, lat. 1½ millim.

D. smaragdula STÅL. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853, p. 174, 1.

Prope Holmiam raro (Dom. BOHEMAN).

4. *D. longifrons* (BOHEM.): pallide testacea; hemelytris abdomine dimidio longioribus, pallide flavotestaceis, hyalinis, vitta subsuturali fusca; pedibus dilute flavotestaceis, femoribus nigrofusco-bilineatis; tarsis apice fuscis ♂. Long. 4, lat. $1\frac{1}{3}$ millim.
D. longifrons BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 42, 12.
Exemplum unicum prope Holmiam legit Dom. P. F. WAHLBERG.
5. *D. guttula* (GERM.): præcedenti valde affinis, capite nonnihil minus producto, frontis carinis magis obsolete distincta; pallide testacea, macula genarum, thoracis lateribus vittaque hemelytrorum subsuturali nigrofusca; hemelytris abdomine fere dimidio longioribus ♂♀. Long. $2\frac{3}{4}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.
D. guttula GERM. Magaz. 3, p. 216, 7. — *D. minuta* FALL. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 129 (anne eadem FABRICII, quæ vix ad *lineolam* pertinet, ut voluit GERMAR.). — ZETT. Faun. Lapp. p. 549, 3. — Ins. Lapp. p. 305, 3.
Per totam Sueciam frequens.
6. *D. pallidula* (BOHEM.): dilute flavotestacea; hemelytris abdomine nonnihil longioribus, testaceohyalinis, nervo longitudinali medio præsertim apice reliquis obscuriore ♂♀. Long. 2, lat. $\frac{3}{4}$ millim.
D. pallidula BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 265, 9. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 48, 16.
In Gottlandia passim frequens (BOHEMAN et ipse).
7. *D. perspicillata* (BOHEM.): pallide flavescens; macula genarum aliaque parva thoracis laterali nigris; hemelytris abdominis longitudine, albidohyalinis ♂♀. Long. $1\frac{1}{3}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.
D. perspicillata BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1845, p. 164, 31. — K. Vet. Ak. Handl. 1845, p. 62, 32.
In Gottlandia rarius (BOHEMAN et ipse). Kinnekulle (BELFRAGE).
Hæc species caput intra oculos subquadratum habet, quare ad divisionem sequentem rectius pertineret; sed propter magnam suam affinitatem cum præcedentibus hic locanda.
- B. *Caput supra intra oculos visum latitudine brevius vel longitudine æquale.*
- a. *Carina frontis a medio fere furcata.*
8. *D. basilinea* (GERM.): fuscescens; thorace medio longitudinaliter, antennis pedibusque pallidis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis, macula subcuneata basali, fascia semicirculari pone medium maculaque parva suturali nigrofusca ♂. Long. $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.
D. basilinea GERM. Magaz. 4, p. 105, 9. — *D. speciosa* BOHEM. K. V. Ak. Handl. 1845, p. 59, 30.
Prope Holmiam ad Tollarö exemplum unicum invenit Dom. BOHEMAN.
9. *D. striatella* (FALL.): pallide testacea; capitis carinis albidis, fusco-marginatis; hemelytris abdomine vix dupplo longioribus, vel tertia fere parte brevioribus, albidohyalinis, stria suturali parva fusca

ornatis: abdomine nigrovario (♂), vel subimmaculato (♀): ♂♀.
Long. 3, lat. $1\frac{1}{2}$ millim.

Form. macroptera hemelytris abdomine longioribus.

D. striata FALL. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 129 (vix GERM.)

— *D. striatella* FALL. Hem. Suec. 2, p. 75, 3.

Forma brachyptera hemelytris abdomine multo brevioribus.

D. hamata BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 45, 14.

In Gottlandia, Scania, Westrogothia, Uplandia et circa Holmiam passim frequens.

Exemplum unicum medium inter formas ambas, hemelytris abdominis longitudine prope Upsaliam ante plures annos legi.

b. *Carina frontis basi tantum, plus minusque distincte furcata.*

10. *D. notula* (GERM.): fronte labroque nigricantibus, albidocarinatis; vertice flavotestaceo; thorace fusco, flavotestaceo-tricarinato; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, albido-hyalinis, nervis subtiliter fuscopunctatis, striola suturali fusca ornatis; abdomine fusco, pedibus dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis ♀. Long. $2\frac{3}{4}$, lat. 1 millim.

D. notula GERM. (sec. exemplum a Dom. SIGNORET communicatum).

In Gottlandia rarissime (Dom. BOHEMAN).

11. *D. pallens* (n. sp.): flavo-testacea; fronte labroque albido-tricarinatis; thorace longitudinaliter albido-tricarinato; hemelytris abdomine vix dupplo longioribus, albidis, hyalinis; subtus nigricans (♂), vel flavotestacea (♀); pedibus flavo-albidis, unguiculis fuscis ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

In Gottlandia et Sudermannia (BOHEMAN), circa Holmiam (ipse); raro occurrit.

Præcedenti subsimilis, sed dilutior, absque stria suturali hemelytrorum. Caput ante oculos nonnihil productum, apice subtruncatum; fronte et labro flavotestaceis, albido-carinatis, carinis fusco-marginatis, carina illius media basi furcata; vertice flavotestaceo, utrimque impresso, medio albido. Prothorax antice productus, truncatus, basi late emarginatus, flavotestaceus, albido-tricarinatus, carinis lateralibus obliquis; mesothorax longitudinaliter tricarinatus, carina media albida, lateralibus obsoletis. Hemelytra abdomine vix dupplo longiora, albida, hyalina, nervis apicem versus obscurioribus, interdum parce fuscopunctatis. Corpus subtus nigricans (♂), vel dilute flavotestaceum (♀). Pedes pallide flavi, unguiculis nigris.

12. *D. lepida* (BOHEM.): nigrofusca; fronte verticeque dilutioribus, parce albidosparsis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, vel dimidio brevioribus, albidis, fuscopunctatis et maculatis; tibiis tarsisque albidoannulatis ♂♀. Long. 2— $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidohyalinis, nervis remote fuscopunctatis, fasciis duabus, una obliqua ante, altera transversa pone medium, fuscis ♀.

D. lepida BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 39, 10.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine dimidio brevioribus, albidis, nervis fuscopunctatis, macula transversa intra apicem nigrofusca ♂♀.

D. tristis BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 60, 25.

Forma macroptera in Gottlandia et circa Holmiam rarius legit BOHEMAN; *forma brachyptera* in Gottlandia, Scania et prope Holmiam passim frequens (BOHEMAN et ipse).

13. *D. limbata* (FABR.): pallide flavotestacea; labro dilute fusco; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus vel vix dimidio brevioribus, albidis, fuscopunctatis et maculatis; abdomine nigrofusco (♂), vel dilute ferrugineo (♀); pedibus ferrugineis ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$ —3, lat. $1\frac{1}{3}$ millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis, punctis nervorum, fascia incurva semicirculari pone medium maculaque parva suturali fuscis ♀.

D. limbata FABR. Ent. Syst. IV, p. 6, 21. — Syst. Rhyng. p. 84, 5. — GERM. Magaz. III, p. 211, 2. — Faun. Ins. Eur. 15, pl. 14, fig. a et b. — *D. signifera* BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1845, p. 164, 30.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, albidis, fuscopunctatis, basi ferrugineis, apice fuscis ♂♀.

D. anceps GERM. Magaz. 4, p. 105, 10. — Faun. Ins. Eur. 15, pl. 14, fig. c et d. — *D. palliata* BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 266, 13. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 56, 22.

Forma macroptera in Sudermannia, Smolandia et Bahusia rarius (BOHEMAN). *Forma brachyptera* in Sudermannia et Ostrogothia (BOHEMAN et WAHLBERG), circa Holmiam et in Scania passim (ipse).

14. *D. hemiptera* (GERM.): nigricans (♂) vel pallide flavotestacea (♀); fronte labroque nigricantibus, dilutius carinatis; prothorace basi transversim albido; hemelytris abdominis longitudine vel eo nonnihil longioribus, sordide hyalinis, nervis elevatis, granulatis; pedibus flavo-albidis, in mare obscurioribus, tarsis apice fuscis ♂♀. Long. $2\frac{1}{3}$, lat. 1 millim.

D. hemiptera GERM. Magaz. 3, p. 217, 8. — ZETTERST. Faun. Lapp. 1, 549, 4. — Ins. Lapp. 306, 4.

Circa Holmiam (ipse), in Smolandia (BOHEMAN), Lapponia (ZETTERSTEDT).

15. *D. pellucida* (FABR.): nigricans; frontis carinis pedibusque sordide flavotestaceis; prothoracis limbo postico plus minus distincte sordide albido; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, pallide testaceo-hyalinis, nervis obscurioribus, obsolete fusco-punctatis et granulatis ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{3}$ millim.

D. pellucida FABR. Syst. Rhyng. 84, 6. — FALL. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 129, 5. — Hem. Succ. 2, 76, 4. — ZETT. Faun. Lapp. 1, 548, 2. — Ins. Lapp. 305, 2. — GERM. Magaz. 3, p. 212, 3.

Per totam Sueciam passim.

16. *D. dispar* (FALL.): nigricans vel pallide flavotestacea; hemelytris abdomine dupplo longioribus, albidis vel dilute testaceis, nervis parum obscurioribus, costali ultra medium albido ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$ —3, lat. $1\frac{1}{3}$ millim.

FALL. K. Vet. Ak. Handl. 1806, p. 126, 3. — Hem. Suec. 2, p. 74, 2. — ZETT. Ins. Lapp. 305, 1. — Faun. Lapp. 1, 548, 1.

var. *a.* nigricans, limbo postico prothoracis anguste albido; hemelytris hyalinis, albidis.

D. marginata FABR. Syst. Rhyng. p. 84, 9.

var. *b.* sordide flavescens, pallida.

D. flavescens FABR. Syst. Rhyng. p. 84, 7.

Per totam Sueciam frequens.

Species hæc et duæ præcedentes vix distinctæ.

17. *D. sordidula* (STÅL): dilute flavotestacea; fronte albidocarinata; vertice thoraceque medio longitudinaliter albidis; hemelytris abdomine vix dupplo longioribus vel plus dimidio brevioribus, albido-hyalinis; abdomine nigrovatio (♂), vel unicolore (♀) ♂♀. Long. 3— $3\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{3}$ millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, nervis flavescentibus, apicem versus obscurioribus ♂♀.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine tertia fere parte brevioribus, hyalinis, nervis flavescentibus ♂♀.

D. sordidula STÅL. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853, p. 174, 2. Circa Holmiam et ad Upsaliam (BOHEMAN et ipse).

18. *D. collina* (BOHEM.): pallide testacea; fronte albido-carinata, carinis fusco-marginatis; hemelytris abdomine dimidio fere brevioribus, margine ad suturam evidenter, postice obsolete albido; abdomine nigrofusco, sordide fulvovatio (♂), vel pallido, lateribus interdum fuscovatio (♀). ♂♀. Long. 2— $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

D. collina BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 51, 18.

Circa Holmiam et in Uplandia (BOHEMAN et ipse).

19. *D. hyalinipennis* (n. sp.): pallide testacea; hemelytris abdomine dupplo fere longioribus, hyalinis, costa ultra medium albida, dein fusca; pedibus dilute flavotestaceis, tarsis apice fuscis ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

Circa Holmiam rara (BOHEMAN et ipse). In Ostrogothia (P. F. WAHLBERG). Kinnekulle (BELFRAGE).

Caput flavotestaceum, intra oculos subtruncatum, vix productum; fronte labroque tricarinatis, carina illius basi subfurcata. Prothorax brevis, antice parum productus, tricarinatus, carinis lateralibus obliquis; mesothorax late triangularis, longitudinaliter tricarinatus, carinis subparallellis. Hemelytra abdomine dupplo longiora, albida, hyalina, nervis dilute flavotestaceis, costa ultra medium albida, dein fusca. Abdomen pallide testaceum, supra utrimque fuscovittatum. Pedes dilute flavotestacei, tarsis apice fuscis.

20. *D. brevipennis* (BOHEM.): pallide testacea; hemelytris abdomine præsertim apud feminam brevioribus, dilute flavotestaceo-hyalinis, elevato-nervis; abdomine supra utrimque fuscovittato ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.

D. brevipennis BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 266, 10. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 49, 17.

Circa Holmiam frequens.

Variat sordide griseoflavescens, obscurior.

Præcedenti valde affinis et forte ejus forma brachyptera.

21. *D. elegantula* (BOHEM.): nigricans (♂), vel sordide flavotestacea (♀); frontis carinis albidis, fuscomarginatis; prothorace albido (♂) vel concolore (♀); hemelytris abdomine dimidio fere brevioribus, sordide albido-hyalinis; abdomine nigro, vitta dorsali maculisque apicalibus fulvescentibus (♂) vel fuscescente-testaceo (♀); pedibus flavotestaceis, tarsis apice fuscis ♂♀. Long. $2\frac{1}{3}$, lat. 1 millim.

D. elegantula BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 63, 27. (♂).

In Blekingia et Smolandia (BOHEM.). Circa Holmiam et in Gottlandia (ipse).

22. *D. obscurella* (BOHEM.): nigrofusca vel fuscotestacea; fronte nigricante, testaceo-carinata; hemelytris abdominis longitudine (♂) vel hoc brevioribus (♀), nervis validis, granulatis; pedibus fuscotestaceis ♂♀. Long. 2, lat. 1 millim.

D. obscurella BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 53, 20.

Circa Holmiam et in Gottlandia non raro (BOHEMAN et ipse).

23. *D. discolor* (BOHEM.): nigricans; fronte pallide testaceocarinata; margine postico pro- et mesothoracis sordide albido; hemelytris abdomine parum (♂) vel dimidio fere (♀) brevioribus, fuscotestaceo-hyalinis, costa sordide albida; pedibus fuscotestaceis ♂♀. Long. 2, lat. 1 millim.

D. discolor BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, 61, 26.

In Gottlandia et circa Holmiam parce (BOHEMAN et ipse).

24. *D. forcipata* (BOHEM.): nigricans; capite pedibusque fuscotestaceis; hemelytris abdomine dimidio brevioribus, basi latius, margine reliquo angustius testaceis, valide nervosis ♂♀. Long. 2, lat. 1 millim.

D. forcipata BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 57, 23.

In monte Kinnekulle (BOHEMAN). In Gottlandia et circa Holmiam passim rarius (BOHEMAN et ipse).

25. *D. exigua* (BOHEM.): pallide testacea; thorace dilutius carinato; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, pallide testaceohyalinis; abdomine nigro (♂), vel sordide testaceo, lateribus fuscomaculato (♀); pedibus sordide flavotestaceis, tarsis apice fuscis ♂♀. Long. $1\frac{3}{4}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.

D. exigua BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 65, 29.

In Gottlandia (BOHEMAN et ipse). Kinnekulle (BOHEMAN).

Femina hujus feminæ *D. elegantulæ* valde similis, sed carinis frontis magis obsoletis, non albidis mox differt.

26. *D. denticauda* (BOHEM.): pallide flavotestacea; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, pallide flavotestaceis; abdomine nigro, anteriori margineque apicali testaceo; tarsis apice fuscis ♂. Long. 2, lat. 1 millim.

- D. denticauda* BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 64, 28.
Circa Holmiam valde rara (BOHEMAN).
27. *D. lugubrina* (BOHEM.): pallide testacea; hemelytris abdomine tertia fere parte brevioribus, nigrofuscis, basi latius testaceomarginatis (♂) vel abdomine dimidio fere brevioribus, testaceis, unicoloribus (♀); ano et abdomine subtus in mare nigris vel nigrovariis ♂♀. Long. ♂ $2\frac{1}{3}$, ♀ 3, lat. $1\frac{1}{3}$ millim.
D. lugubrina BOHEM. Öfvers. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1847, p. 266, 11. — K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 55, 21.
In Smolandia et Blekingia (BOHEMAN). Circa Holmiam rarius (ipse).
28. *D. pullula* (BOHEM.): testacea, subtus nigrovaria; hemelytris abdomine multo brevioribus, nigrofuscis, basi apiceque anguste testaceomarginatis; genitalibus nigris ♂. Long. $1\frac{1}{2}$, lat. $\frac{3}{4}$ millim.
D. pullula BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 116.
In Smolandia rarissime (BOHEMAN).
29. *D. mesomela* (BOHEM.): capite hemelytris exceptis atra (♂), vel tota pallide flava (♀); hemelytris abdomine brevioribus albidis; segmento penultimo abdominis in mare apice albomarginato; geniculis maris sordide flavotestaceis ♂♀. Long. 2— $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.
D. mesomela BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1849, p. 257.
In Gottlandia et circa Holmiam rara (BOHEMAN et ipse). Kinnekulle (BELFRAGE).
30. *D. bivittata* (BOHEM.): dilute flavotestacea; supra utrimque vitta in fronte cum opposita conjuncta nigrofusca; hemelytris abdomine dimidio brevioribus, cum sutura non contiguis, vitta fusca ornatis ♂♀. Long. 2, lat. $\frac{3}{4}$ millim.
D. bivittata BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1849, p. 259.
In Gottlandia et circa Holmiam parce (BOHEMAN et ipse).

II. Frons bicarinata.

31. *D. albosignata* (DAHLB.): nigricans; vertice toto, prothorace mesothoraceque medio flavoalbidis; hemelytris abdomine dupplo longioribus vel vix dimidio brevioribus; abdomine segmentis basalibus supra flavomarginatis; geniculis metatarsisque posticis sordide albidis ♂♀. Long. $2\frac{1}{2}$, lat. 1 millim.
Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus, sordide albidohyalinis, nervis fuscis ♂♀.
D. fuscinervis BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 113.
Forma brachyptera: hemelytris abdomine dimidio brevioribus, fuscohyalinis, apice obscurioribus ♂♀.
D. albosignata DAHLB. K. Vet. Ak. Handl. 1850, p. 199.
In Blekingia (BOHEMAN), Gottlandia (DAHLBOM).
Frons in hac specie non unicarinata, ut dicit BOHEMAN, sed distincte bicarinata.
32. *D. moesta* (BOHEM.): nigrofusca (♂) vel fuscotestacea (♀); prothorace et mesothorace fuscotestaceis, margine postico sordide albidis; hemelytris abdomine dupplo longioribus, sordide albidohyalinis, vel

eo dimidio brevioribus, nigrofuscis, apice albidomarginatis; pedibus fuscotestaceis ♂♀. Long. 2—2½, lat. 1 millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine dupplo longioribus.

D. collaris STÅL. Öfvérs. af K. Vet. Ak. Förhandl. 1853, p. 175, 3.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine dimidio brevioribus.

D. moesta BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 59, 24.

In Gottlandia et circa Holmiam passim (BOHEMAN et ipse).

33. *D. nasalis* (BOHEM.): pallide flavotestacea; fronte apice maculis 2 mesothoraceque utrimque macula nigris; hemelytris abdomine non-nihil longioribus vel vix dimidio brevioribus, albidohyalinis; abdomine maris nigricante, foeminæ supra vitta utrimque obscuriore ♂♀. Long. 3, lat. 1½ millim.

Forma macroptera: hemelytris abdomine longioribus.

D. nasalis BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 41, 11.

Forma brachyptera: hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus.

D. mutabilis BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 43, 13.

In Gottlandia, Scania et circa Holmiam sat frequens, forma macroptera tamen valde rarior (BOHEMAN et ipse).

Frons in hac specie non tricarinata, h. e. medio unicarinata, ut dicit BOHEMAN, sed obsolete bicarinata.

34. *D. Pteridis* (BOHEM.): nigra, nitida; antennis, prothorace pedibusque flavis; hemelytris nigris (♂) vel griceis, basi interdum dilutioribus (♀); tarsis apice nigrofuscis ♂♀. Long. 2—3, lat. 1—1½ millim.

D. Pteridis BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1852, p. 115.

In Blekingia et Smolandia (BOHEMAN).

35. *D. raniceps* (BOHEM.): dilute flavotestacea; oculis nigrofuscis; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, cum sutura non contiguus, valde distantibus. Long. 2, lat. ¾ millim.

D. raniceps BOHEM. K. Vet. Ak. Handl. 1847, p. 52, 19.

In Gottlandia (BOHEMAN et ipse).

4. *Om hannen af Scytodes thoracicus*. — Hr BOHEMAN föredrog nedanstående af Studenten Hr T. THORELL inlemnade uppsats:

»Bland intressantare Arachnider, som under en sommaren förlidet år företagen utländsk resa af mig blifvit funna, befinner sig ett han-exemplar af *Scytodes thoracicus* LATR., en spindel, som förekommer temligen allmänt i länderna kring Medelhafvet. Denna art är den typiska för det märkvärdiga, öfverallt afvikande släktet *Scytodes*, hvars plats i systemet också är ganska vacklande, så att, ehuru det rättast synes böra hän-