



<http://www.biodiversitylibrary.org/>

Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar.

Stockholm :L.L. Grefing,

<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/50688>

[ser.2]:t.23 (1802): <http://www.biodiversitylibrary.org/item/180075>

Article/Chapter Title: Copicerus, et nytt slägte bland insecterne fran Westindien

Author(s): Swartz O. 1802a

Subject(s): Hemiptera, Homoptera, Fulgoroidea

Page(s): Page 177, Page 178, Page 179, Page 180, Page 181, Page 182, Page 183, Text

Contributed by: Natural History Museum Library, London

Sponsored by: Natural History Museum Library, London

Generated 26 February 2016 9:06 AM

<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/048861600180075>

This page intentionally left blank.

COPICERUS,

Et nytt släkte bland Insecterne från Westindien,

beskrifvit af O. SVARTZ.

Den ordningen af Insecterñas flock som LINNÆUS kallade *Hemiptera* (Skinnbaggar) har enligt FABRICII system blifvit delad i tvåne, nemligen i *Ulonata*, dit *Blatta*, *Mantis* och *Grylli* slägter jämte *Forficula* åro räknade, och i *Ryngota*, hvartil de öfrige genera hóra. De förra närlägga sig, i affeende på munnens vårttyg til Skalbaggarne, (Coleoptera) då däremot de sednare genom en egen flags snabel och Munnbalja i stället för kåsttar vida skilja sig ifrån dem, hvartil deras öfriga utseende, förhållandet och ofta låget af deras vingar, samt Spröt ej litet bidraga.

At likväl denne sednare omständighet icke är någon beständig regel, har jag vid uptäckten af nedanföre beskrifne Yrfå haft tilfälle at årfara.

Detta som hörer til de få kallade *Täckvingar* (Hemelytra), emedan de öfre vingarne åro af et medelåmne emellan läderlikt och hinnaktigt, och hvilket måste enligt sin snabel fåtas ibland *Ryngota*, åger dock vid första ögnekaftet snarlikhet med Skalbaggarne, och det färdeles i följe af sine besynnerlige och märkvärdige antenner, genom hvilka det också synes

nes färskilt ifrån alla Samflågtingar af sin egen ordning.

Insectet är litet, ungefär 3 linier i längden, til skapnaden afslångt och platt.

Det åger et litet rundt *hufvud*, ofvanföre snytet (fronte) något framstående trubbigt emellan de runda, utslående och mot sidorna vettande mörka *ögönen*.

Spröten nästan af kroppens längd, sittande under ögonen (hvilka vid sprötens rotfäste synas klufne) utspärrande, knappt tilbakaböjd, knifbladslike, af två ledar som åro platte och hoptryckte, rundade och hvasse mot den främre kanten, men trekantige baktil; på den öfre sidan något concave, på den undre litet uphögd. Den första leden spitsas inåt hufvudet, men är bred och urnjupen där den med den andre hopfogas. Den andre leden är mer rundad vid basen, nästan bredare än den första och slutas med en utdragen men trubbig spits. I kanten åro både lederne håriga åfven som på den undre sidan. Deras färg är mörkbrun och fläckig.

Bålen är rund. *Ryggen* kullrig och bar med sina bruna punter. *Lilla skölden* nedanföre ryggen är tresidig, något uphögd och skräflig.

Munnen med inböjd råt *Snabel* af bålens längd, tiltryckt mot bröstet; med en kåggel-formig och spitsad *Läpp* som är ofvantil (undre delen af sjelfva Snytet) ljusare, nedantil trekantig, mörkare.

Munn-

Munnbaljan och des *Setæ* döljas under snabeln och synas vara af den sammas längd.

Skalvingarne nästan hinnaktige, jämnbredt aflänge, helt platte, längre än bålgen, uptoil snedskuren mot lilla ryggskölden, fästade utåt vid bålens nedre kant; vid nedre åndarne, rundade, fritt utstående, icke inböjde, eller på hvarannan liggande, strimige medelst upphöjde, längsefter löpande ränder som åro svartprickige. Upåt bålen är de halfgenomskinlige skalvingarnes färg ljusbrun, skiftande, men ned emot åndan svartblå. Hår synas åfven ränderne sammanbundne.

Vingarne åro kortare än skalvingarne, af lika skapnad med dem, men mera hinnaktige med sammanbundne ådror.

Bålgen är ågglik, platt, något sammantryckt, med svarta skinande leder; hvass mot *Arsen*.

Låren och *Benpiporna* åro långe, kantige och för synglaset med fina hår försedd. *Hållarne* bestå af tre små leder och slutar ytterst med tvånne klor. Bakbenen åro något längre. Til färgen åro desse delar belt ljuse, men låren i synnerhet med små bruna puncter beströdde; benen hafva också svarta ringar, och de ytterste hål-lederne på de främste fötterne åro svarta.

Af nu anförde och med synglasets tilhjelp gjorde beskrifning, synes denne *Insect* aldeles icke kunna med *Cicadæ* eller dess slägtingar förenas. Deras nedböjde vingar, Bålens och

Bål-

Båljens stållning utvisar deras skillnad, at jag icke må nämna deras knäpt märkbare, ofta undangjömde spröt. Med *Nepa* och *Notonecta* samt deras närmaste, är icke heller betydeligare likhet. Deras på hvarandra liggande vingar, fötternas olika skapnad, ge utom sprötens förhållande utmärkte skiljemärken. Åfven med de under det Naturliga *Cimex*-flågtet hörande, är icke någon större öfverensstämmelse, som få väl af vingarnes låge som af Snytets, Bålens och Sprötens form inhåmtas.

Således, i följe af den olikhet som jag trodt mig finna emellan denna Insect och de förr kånde flågter, torde jag på vanligt språk få upstålla den som et egit, hörande til *Ryngota* efter FABRICII system och til genera af denna ordnings första afdelning: *rostro inflexo*.

Jag har kallat det:

COPICERUS.

Charact. naturalis.

Os rostro absque maxillis palpisque.

Rostrum inflexum, elongatum, acuminatum

*Vagina sub labio recondita, ejusdem
longitudine*

Setæ

*Labium conico-subulatum, carinatum sub
3quetrum, rigidum, vaginam tegens.*

*Antennæ sub oculis insertæ, longæ, arcuato-
patentes, ensiformes, biarticulatæ: ar-
ticulis oblongis, compresis, antice ellip-
ticis*

1802, Julii, Aug. Sept.

181

ticis acutis, postice rectis, angulatis; secundo apice attenuato, obtuso.

Metamorphosis & vietus adhuc latent.

Charact. essentialis.

Labium conico-subulatum, carinatum.

Antennæ ensiformes, biarticulatæ, sub oculis insertæ.

(post thripfin).

Stållet i systemet efter *Naucoris*.

Namnet är tagit af Grekiska ordet Κοπίς culter, gladius, och κερας cornu, hvartil Sprötens skapnad ge anledning.

Descriptio specifica.

COPICERUS irrocatus.

Corpus oblongum, planum, compressum, longitudine 3 lin.

Caput parvum, fronte parum prominente obtusa, fusca.

Oculi rotundati, prominuli, laterales, fusco-nigricantes.

Antennæ sub oculis ad marginem bifidum ipsius globi insertæ, longitudine fere corporis, ensiformes, patentes, subarcuatæ, biarticulatæ: *Articulis* compressis oblongis, antice elliptico-rotundatis acutis postice rectis angulatis subtriquetris; supra concaviusculis, subtus convexis, margine subtusque (oculo armato) hispido-pilois, fusco maculatis, primo ballo, secundo apice attenuato, obtuso.

K. V. A. Handl. III. Qu.

N

Rostrum

1802, Julii, Aug. Sept.

Rostrum e fronte prominente continuatum, elongatum, inflexum.

Vagina & setæ sub labio latent.

Labium corneum, conico-subulatum, longitudine thoracis, pectori incumbens, carinatum, sub tre questrum.

Thorax rotundatus, convexus, punctis minutissimis ferrugineis irroratus.

Scutellum triangulare, subconvexum, inaequale, pallidum.

Elytræ abdomine longiores, linearis-oblongæ submembranaceæ, planæ, apice rotundatæ nec inflexæ nec incumbentes; lineis portatis, ad apicem anastomosantibus, punctisque nigris undique irroratis; fuscescentes, apicem versus cæruleo-nigricantes.

Alæ elytris parum breviores, conformes-obtusæ, diaphanæ, venis anastomosantibus.

Abdomen ovatum, immarginatum, compressiusculum, ano acuto; *Segmentes* atris, nitidis.

Pedes longiusculi, tenues, cursorii.

Femora angulata, pallida, ferrugineo punctulata *Tibiæ* fusco annulatis tenuissime subpilosa.

Tarsi triarticulati, spinulosi, antici nigricantes, postici pallidi, ungibus nigris.

Denna Insect tråffade jag 1785 under mine
resor på Jamaica, där den en enda gång på
bladen

bladen af något Tråd årtappades. Jag har således aldrig haft tilfalle at vidare se eller blifva om dess hushållning underrättad. Det exemplar jag deraf hemfördt, förvaras i det af Prof. och Riddaren THUNBERG til Upsala Academie förårade Naturalie Cabinet.

Tabellens uttydning. Tab. 6. N:o 2.

Copicerus irroratus.

- a. i naturlig storlek.
 - b. den samma mycket förstorad.
 - c. - - - på främre delen sedd.
 - d. hufvudet med spröten samt bålen. Det ena sprötet visar bakre kanten med des tre hörn.
 - e. öfre delen af Insectet: som visar Snabelns form och läge, och sprötens vidfästning.
 - f. Insectet på sidan sedt för att visa dess platthet; något större än naturen.
-

Minerographiske anmärkningar öfver Öland.

af W. HISINGER.

Den benägenhet hvarmed Kongl. Academien behagat emottaga tvåne Minerographiske Afhandlingar, om Västergöthland och om Gotland, har upmuntrat mig uti den föresatts at tid efter annan öfverfara våra Flótstrakter och

Tab VI. N^o I.




Fig. 2.

Fig. 3.




Fig. 1.

Tab. VI. N^o 2.

