Berg 1881b

Berg, C. 1881b. Sinonimia y descripcion de algunos Hemipteros de Chile, del Brasil y de Bolivia. An. Soc. Cient. Argentina 12: 259-272

SINONIMIA Y DESCRIPCION

DE ALGUNOS

HEMÍPTEROS DE CHILE

DEL BRASIL Y DE BOLIVIA

POR EL

D^or^ CÁRLOS BERG

(DE LOS ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA,
TOMO XII, P. 259-272. — 1881).

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE PABLO E. CONI, ESPECIAL PARA OBRAS
60 — CALLE ALSINA — 60

1881

Se acerca algo al *L. odontogaster* ZETT., distinguiéndose de este por el tamaño, la estructura de los diferentes órganos y la coloracion.

El ejemplar típico se conserva en el Gabinete de Historia Natural de Buenos Aires.

En la coleccion del Dr. SIGNORET he visto tambien un par de ejemplares bajo el mismo nombre que he dado á esta especie.

HEMIPTERA HOMOPTERA.

9. **Proarna praegracilis** *nov. spec.*

♀: Gracillima, satis sericea, flavovirens, infra lutescens, capite toto fere, pronoto medio marginibusque lateralibus, mesonoto maxima ex parte tegminibusque apud venas duas transversas primas, infuscatis; capite parte antica pronoto paullo latiore, vertice oculo transverso paullo plus quam duplo et dimidio latiore, fronte convexiuscula, dimidium faciei occupante, clypeo ante apicem acuminatum levissime compresso; rostro coxas medias superante, apice fusco; ocellis posticis ab oculis quam inter se circiter tertia parte longius remotis; pronoto marginibus lateralibus pone medium leviter sinuatis; mesonato laeviusculo, marginibus lateralibus olivaceis, scutello olivaceo, sat elevato postice modice excavato; dorso abdominis sordide luteo, marginibus segmentorum fimbriatis; tegminibus hyalinis, venis luridis, apicem versus fuscescentibus, membrana apud venas transversales primas perparum infuscata, area octava apicali septima multo longiore; pectore dense flavido-sericeo; ventre subnitente, segmento ultimo apice medio exciso et utrimque leniter sinuato; pedibus sordide flavidis, sericeis.— Long. corp. 14, tegm. 18; lat. cap. 4 $^1/_2$, meson. 5 mm.

Patria: Bolivia.

El Museo Público posee un ejemplar de esta especie que es característica por sus formas tenues, las tégminas muy largas y la coloracion poco intensa sin dibujos bien marcados.

TARACTICUS.

(Novum genus *Achilinarum*).

Corpus subdepressum. Caput pronoto multo angustius, ante oculos prominulum; vertice oulis fere aequilato, subtransverso, antice profunde sinuato, marginibus medioque elevatis; fronte clypeoque conjunctim longe ellipticis, amborum carina media, hoc carinis lateralibus, illa carinis sublateralibus distinctis, his tamen basin versus obsoletis. Oculi rotundati, propemodum integri. Ocelli validi. Antennae articulo secundo magniusculo, obovato. Pronotum longiusculum, disco percurrente tricarinatum, postice angulato-emarginatum. Mesonotum fere aeque longum ac latum, tricarinatum, carina media pone medium abbreviata. Tegmina apice rotundata, ad apicem reticulata, vena clavi admodum ante apicem terminante, venis radiali et ulnari exteriori base in unam conjunctis, deinde valde separatis. Pedes longiusculi; tibiis anticis femoribus tronchateribusque simul sumtis paullo longioribus, tibiis posticis spinis septem vel octo armatis.

Este nuevo género se coloca cerca de *Faventia* STÅL, del cual se distingue por el pronoto mas largo, por el limbo redondeado de las tégminas, por la vena ulnar interior que nace cerca de la base del tégmen, y por las tibias posteriores provistas de 7 á 8 espinas.

10. **Taracticus chilensis** (SPIN.) BERG.

Cixius chilensis SPIN. in GAY, Hist. de Chile. Zool. VII, p. 249.2 (1852).

El *Cixius chilensis* SPIN. es el que me ha servido para establecer mi nuevo género *Taracticus*. Poseo una ♀ de Valdivia, recojida por el Sr. D. C. ANWANDTER, y la que he comparado con un ejemplar típico en París.

La especie se puede reconocer fácilmente por la descripcion que da SPINOLA. Es de color testáceo ó amarillo-grisáceo con manchas

fuscas, que están bien marcadas en la cabeza, la frente, el mesonoto, las tégminas, la parte inferior del cuerpo y las patas. La parte apical de la frente y el clipeo en su mayor parte son amarillos, como las patas que llevan en todos los fémures y en las tibias anteriores y medias de dos á tres anillos anchos, oscuros; la arista espinoso de las tibias posteriores es fusca, como las partes laterales del esternon con poca excepcion. El último tercio de las tégminas es mas claro que los dos tercios anteriores que están provistas de manchas bastante grandes. La frente es fusca en su mayor parte, teniendo pequeñas manchas amarillas en sus partes basilar y laterales.

La cabeza es pequeña y corta. Las tres carenas de la frente se pierden en direccion de la base acercándose entre si; las laterales van divergiéndose hácia las partes laterales de la frente y se terminan en su parte ancha; las carenas del clipeo no se unen en su ápice. El pronoto es en su base casi doble del ancho de la cabeza. Las márgenes postero-laterales del mesonoto son suavemente sinuadas. El segmento anal de la ♀ lleva un pequeño diente en la sinuosidad ancha; los lóbulos anales son casi semicirculares, con la márgen interna mas ó ménos recta. — Longitud del cuerpo 8, de las tégminas 8; latitud de la cabeza 1 $^1/_2$, de la parte posterior del pronoto 2 $^3/_4$ milímetros.

11. **Liburnia fusco-irrorata** (Blanch.) Berg.

* *Delphax fusco-irrorata* Blanch. in Gay, Hist. de Chile. Zool. VII, p. 260.3 (1852).

A causa de la longitud del segundo artículo de las antenas, se ha debido cambiar el género de la especie en cuestion. Le he recojido en Valdivia.

Es de color gris ó fusco-amarillento, con manchas oscuras y puntos negruzcos en los hemélitros. El cuerpo es generalmente de color fusco, teniendo la frente en su parte media una faja transversal amarillenta. Las cuatro carenas de la frente son bien marcadas, las dos medias se unen en la base pero no en el ápice. El clipeo tiene tres carenas, siendo la media desvanecida en la base. Las tres carenas de la cabeza y del pronoto son bien marcadas y este último tiene en su borde posterior una escotadura bien pronunciada. El mesonoto tiene cinco carenas, cuya media es rectilínea y las demas algo arqueadas, dispuestas en forma de una lira. El escudillo es

transversalmente estriado. Los fémures llevan líneas oscuras; las tibias tienen una línea oscura desvanecida y están ofuscadas en las partes basilar y terminal.— Longitud del cuerpo de 3 $^1/_2$ á 4, de las tégminas cerca de 4, y latitud del mesonoto 1 $^1/_2$ milímetros.

12. **Triquetra rubro-costata** (Spin.) Stål.

Hemiptycha rubro-costata Spin. in Gay, Hist. de Chile. VII, p. 272.3 (1852).
Smilia unicolor Sign., Ann. Soc. Ent. de Fr. Sér. 4. III, p. 584.134 (1863).
Triquetra rubro-costata Stål, Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1869, 3. p. 266.1.
* *Triquetra unicolor* Stål, Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1869, 3. p. 266.2.

Esta especie es muy variable en la coloracion y la *T. unicolor* no puede ser separada de la misma.

13. **Xerophloea viridis** (Fabr.) Stål.

Cito esta especie aquí á causa de su distribucion geográfica. No estaba señalada de Chile, donde la he observado en las provincias de Araucania y de Valdivia.

14. **Athysanus araucanus** *nov. spec.*

♀: Supra nitida, obscure lutea, apice capitis maculisque obsoletis apicis et marginis interioris tegminum pallidioribus, infra cum margine dorsi abdominis pedibusque ochracea; capite obtuso-triangulari, subtilissime punctato, prope marginem posticum maculis duabus flavidis sublaevigatis et linea media obsolete fuscescenti ornato; fronte, clypeo lorisque densissime punctulatis, ochraceis, illa medio fere plana, ad latera rarissime infuscata; pronoto transversim rugoso-striato, antice punctulato et foveolato, interdum flavido-irrorato; scutello pone medium transverso-impresso, parte antica punctulata, maculeolis vel vitteolis duabus aut quattuor ornata, saepissime immaculata, parte