

Darley

*Berg 1883a
p 180-191*

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA

COMISION REDACTORA

Presidente..... Ingeniero D. GUILLERMO WHITE.
Secretario..... D. CÁRLOS D. DUNCAN.
Vocales..... } Ingeniero D. EDUARDO AGUIRRE.
 } Dr. D. PEDRO N. ARATA.
 } Dr. D. CÁRLOS SPEGAZZINI.

OCTUBRE DE 1883. — ENTREGA IV. — TOMO XVI

PUNTOS Y PRECIOS DE SUSCRICION

LOCAL DE LA SOCIEDAD, RECONQUISTA 93, Y EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

Por mes, en la Ciudad.....	20 \$ m/c
Un semestre.....	110 "
Un año.....	200 "
Por mes, fuera de la Ciudad....	30 " entrega

La suscripción se paga anticipada

BUENOS AIRES

IMPRENTA DE PABLO E. CONI, ESPECIAL PARA OBRAS
60 — CALLE ALSINA — 60

1883

Berg, C. 1883. Addenda et Errata. Hemeroteca Argentina (Continente). An. Soc. Cient. Argentina 1883-1884

0137. ***Derotettix mendosensis* BERG.**

✓ *Derotettix mendosensis* BERG., Anal. Soc. Cient. Arg. XIV, p. 47. 11 et Contr. Cic. Arg. p. 12. 11 (1882).

El único ejemplar de esta chicharra, que sirvió para establecer el nuevo género, y que fué descubierto por el Dr. BURMEISTER en Mendoza, se encuentra en el Museo Público de Buenos Aires.

Fam. FULGORIDAE.

♂ Subf. FULGORINA.

♂ Gen. LATERNARIA LINN., STÅL.

♀ ④ 138 (257). ***Laternaria lucifera* (GERM.) BERG.**

He examinado el ejemplar típico de esta especie en el Museo Real de Berlin, y puedo afirmar con certeza que la sinonimia dada por mí anteriormente es válida.

♂ Gen. PHENAX GERM.

Phenax GERM. in SILB., Rev. Ent. I, p. 175 (1833). — BURM., Handb. II, 1, p. 167. (1835) et Gen. Ins. 20 (1840). — BLANCH., Hist. des Ins. III, p. 170 (1840). — AM. et SERV., Hém. p. 498 (1843). — STÅL, Hem. Afr. IV, p. 135 (1866) et Stett. Ent. Zeit. XXXI, p. 287 (1870).

✓ ♂ *Eumallia* GUÉR., Voy. aux Ind. Orient. par Bél. Zool. p. 451 (1834).

✓ ♂ *Phaenax* SPIN., Anal. Soc. Ent. de Fr. Sér. 1. VIII, p. 316 (1839).

♀ 139. ***Phenax variegata* (OLIV.) GERM.**

♂ *Fulgora variegata* OLIV., Ent. Méth. VI, p. 375. 30 (1791). — GERM. in THON, Ent. Arch. II, 2, p. 46. 9 (1830).

Phenax variegata GERM. in SILB., Rev. Ent. I, p. 175. 3 (1833). — BURM., Handb. II, 1, p. 167. 1 (1835). — BLANCH., Hist. des Ins. III, p. 170. pl. 12, fig. 3 (1840). — AM. et SERV., Hém. p. 498. 1 (1843). — WALK., List of Hom. II, p. 335. 1 (1851).

✓ ♂ *Eumallia variegata* Guér., Voy. aux Ind. Orient. par Bél. Zool. p. 451. 11 (1834).

✓ ♂ *Phaenax reticulata* SPIN., Anal. Soc. Ent. de Fr. Sér. 1. VIII, p. 316 (1839). — STOLL, Cig. fig. 45 (1788).

Patria: Brasilia. — Republica Uruguayensis.

En el Museo Real de Berlin se halla una pseudo-imágen de esta especie, colecciónada por SELLW en Montevideo. Al enumerar los hemípteros argentinos, he tomado siempre en cuenta los de la vecina República Oriental, de manera que lo hago también respecto a esta especie.

✓ ♂ Subf. DICTYOPHARINA.

✓ ♂ Gen. DICTYOPHARA GERM.

✓ ♂ 140. **Dictyophara polyneura** n. sp.

♂ et ♀: Flavescenti-virides, ex parte flavidii aut aurantiaci, tegminibus processuque capitii apices versus, segmento anali abdominis, femoribus ad basin et tibiis ad apicem tarsisque viridibus; processu capitii longe producto, latitudine verticis triplo largiore, valido, sensim acuminato, supra tri- et infra quinquecarinato, carinis mediis subobsoletis, ad latera tantum in mare prope oculos obsoletissime carinato; tegminibus, areis ulnaribus radialibusque et costa a pterostigmate exceptis, dense, praecipue limbum versus, reticulatis. — Long. corp. cum proc. capit. 12-13, capit. cum proc. 2,5-3, tegm. 9-10; lat. meson. 2,5, part. post. tegm. 5-6 mm.

Caput cum processu modice ascendens, hoc apice obtuso, supra concaviusculo, infra sat concavo; vertice oculo triplo fere latiore, basi parum marginato; fronte cum marginibus quinquecarinata; clypeo medio marginibusque carinato; rostro ultra coxas posteriores extenso, articulo terminali praecedente aequilongo. Oculi mediocres, elongati. Pronotum medio carinatum, antice inter oculos rotundato-productum et modice marginatum, postice late triangulariter excisum. Mesonotum carinis tribus fere parallelis et percurrentibus instructum. Tegmina virescenti-hyalina, venis ex parte viridibus, ex parte testaceis, pterostigmate concolori, multiaareolatae. Pectus

abdomenque aurantiaca aut virescentia. Tibiae posterioribus extus spinis quatuor vel quinque et apice octo armatis.

Patria: Respublica Argentina et Uruguayensis.

Muy característica por el proceso de la cabeza bastante válido y acuminado, y sobre todo por las tegminas sumamente reticuladas en toda su extensión, con excepción de las áreas ulnares y radiales y de la costa hasta el pterostigma.

Poseo tres ejemplares, de los cuales recibí uno muy defectuoso y descolorido, en aguardiente, del Dr. D. ADOLFO DOERING, colecionado en la Sierra de Córdoba, y recogí los dos otros en la Banda Oriental del Uruguay, en las orillas del Río Maciel, en el mes de Febrero.

♂ Subf. CIXIINA.

♂ Gen. OLARIUS STÅL.

♂ 141. **Oliarius transitorius** n. sp.

♂: Piceus, subopacus, carinis marginibusque capitii, frontis, clypei, pronoti, mesonoti ex parte, pectoris abdominisque, venis tegminum, geniculis pedum, tibiis ad partem tarsisque, nec non lobulis analibus, plus minusve testaceis; carina laterali mesonoti sat infuscata, carina sublaterali vel submedia sat obsoleta et antice valde abbreviata; venis tegminum fusco-granulatis, setigeris, venulis transversis et margine commissurali prope apicem clavi fuscis. — Long. corp. 3, cum tegm. 4; lat. 4,4 mm.

Vertex capitii fere aequo longus ac latus, anterius vix angustatus, concavus, postice triangulatiter excisus, carinis apicalibus triangulum singulibus. Frons et clypeus ad unum aream ovalem, lenissime convexam, medio et ad marginem carinatam singentes. Rostrum coxas intermedias paullo superans. Pronotum capite vix latius, brevissimum, postice valde lateque excisum. Mesonotum

capite paullo latius, carinis media et laterali percurrentibus, submedia multo humiliore, antice abbreviata. Tegmina hyalina, venis ad limbum dense granulatis, radiali mox ante medium et ulnari interiore sat longe ante medium furcatis, pterostigmate maximam ad partem niveo. Alae venis infuscatis praeditae. Lobuli laterali-anales oblongi, conjuncti; lobulus mediū parvus, acuminatus. Tibiae posticae extus bi-vel tridentatae et apice sexdentatae.

Patria: Respublica Uruguayensis.

Es una especie semi-transitoria entre los géneros *Hyalesthes* SIGN. y *Oliarius* STÅL, teniendo el mayor número de caracteres de este último, sobre todo las once celdillas apicales de las tegminas, las tres espinas en la mitad basilar de las tibias posteriores y las fosetas terminales del vértice bien determinadas por las carenas salientes. Se acerca al *Hyalesthes* por las carenas intermedias del mesonoto desvanecidas y anteriormente interrumpidas y por la frente muy poco separada del clipeo, por ser la sutura apenas indicada. El ojo simple en la parte sutural de la carena allí no bifurcada, es bien visible.

Poseo un solo ejemplar que he recogido en la Banda Oriental del Uruguay, cerca del Río Corralito, á fines de Febrero de 1883.

○ Gen. *Cixiosoma* BERG.

Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 185 et Hem. Arg. p. 220 (1879).

○ 142. *Cixiosoma bonaerense* n. sp.

♂ et ♀: Fuscescentes, ex parte lutei aut sordide lutei ad partem infuscata, marginibus carinibusque partium diversarum corporis et interdum pectore pedibusque pallidioribus; tegminibus subhyalinis, granulis, infuscatione obliqua costali-basali, fascia obliqua media, illius ad costam approximata vel convergente, fasciaque ex parte obsoleta sublimbali, cum praecedente ad costam divergente, nec non vittula subobliqua limbali fuscis (fasciis tribus vittulaque figuram \ / \ — formante). —

Long. corp. 3,2-3,7, cum tegm. 4,5-5,1; lat. meson. 4,4-4,3 mm.

Vertex fere aequo longus ac latus, medio marginibusque distincte carinatus, carinibus transversis obsoletis, margine postico late rotundato-sinuato. Frons utrimque non sed apice valde sinuata et ampliata, cum clipeo distincte carinata. Rostrum coxas posticas superans. Mesonotum fuscum, carinis antrorum modice convergentibus, carina media apice abbreviata. Tegmina valde granulata, picturis interdum obsoletis aut interruptis. Alae vitreae. Abdomen saepe obscure fuscum, segmentorum marginibus segmentoque anali testaceis. Pedes colore variabiles, fuscescentes, lutei, testacei, ex parte fusco luteoque variegati; tibiis posticis generaliter pallidioribus.

Patria: Provincia Bonaerensis.

Se distingue del *Cixiosoma platense* BERG por el cuerpo menos esbelto, por el vértice algo mas corto, por la trompa mas larga, por la coloracion mas oscura en general y en particular por las fajas fuscas de las tegminas.

Los ejemplares que poseo fueron recogidos por el Sr. D. FÉLIX LYNCH en Chacabuco, y por mí en Buenos Aires.

○ Subf. *OMMATIDIOTINA* BERG.

✓ ○ *Issida* (partim) STÅL, Hem. Afr. IV, p. 131 et 202 (1836).
✓ ○ *Omnatidioti* FIEB., Rev. et Mag. de Zool. Sér. 3. III, p. 359 et Cicad. d'Europ. p. 75 (1875).

✓ ○ *PLAGIOPSIS* n. gen.

Caput multo latius quam longius; vertice admodum latiore quam longiore, antice obsolete pentagonalis, humiliore, medio subarcuatim transverso-impresso, pone impressionem subcarinato et margine postico carinato, leniter sinuato; fronte transversa, dimidio latiore quam longiore, subpentagonalis, margine basali subrecto, angulo medio obsoletis-

simo, marginibus lateralibus arcuatis, carinato-elevatis, carina media longitudinati distincta; clypeo medio vix vel tantum basi apiceque carinato; spatio discreto inter frontem et clypeum nodulis ocelliformibus quattuor, et parte ante temporali vel latero-frontali extus intusque carinata, nodulis plurimis ex parte in series duas dispositis instructis. Rostrum coxas intermedias paullo superans, articulo terminali brevi. Oculi oblongi, infra vix sinuati. Ocelli desunt. Antennarum articulo basali brevi, secundo majuscule, subgloboso, tuberculato. Pronotum antice arcuatum, ad vel ultra medium oculorum antrorum productum, medio subcarinatum, postice in mare sat profunde exciso-sinuatum, in femina leviter lateque sinuatum. Mesonotum haud carinatum, medio linea longitudinali subimpressum, utrimque ut in lateribus prōnoti ocellato-punctatum, postice longe productum et utrimque sinuatum. Tegmina subcoriacea, sectoribus tribus e venula basali communi orientibus simplicibus, raro duobus interioribus venulis transversis, una ante, altera pone medium, praeditis, ante limbum venulis transversis duabus conjunctis, cellulis apicalibus quatuor, quibus secunda parva, e bifurcatione venulæ secundae formante, venula furcata clavi sat longe petiolata. Pedes simplices; tibiae posticæ mox pone medium unispinosæ, apice sexspinosa, spinis lateralibus magnis; tarsis posticis longitudine dimidio tibiae, articulo basali oblongo, incrassato, duobus sequentibus aequilongo.

Solo lo puedo comparar con el género *Ommatidiotus* SPIN., por la forma general y por la del vértice y del pronoto, y por la estructura de las tégminas. Se distingue del mismo por la frente transversal y su estructura, por la impresión del vértice, por la sinuosidad posterior del pronoto del macho, por la carencia de las carenas del mesonoto, su ápice prolongado, sus márgenes posterolaterales sinuadas y sus partes laterales, como en el pronoto, ocelado-punteadas, por la serie simple de celdillas apicales en las

tégminas, y por las tibias posteriores mas largas y su tarso basilar oblongo y mas largo.

La frente es muy particular, representándose como una placa transversal, algo convexa, carenada en el medio y en sus bordes y separada en los lados por un espacio subfrontal ó subtemporal, exteriormente carenado; en este último, entre el ojo y la carena marginal de la placa y entre esta y el cípupo, se encuentran los nódulos oceliformes, parecidos á los de las partes laterales del pronoto y mesonoto.

✓ 143. ***Plagiopsis Distanti* n. sp.**

♂ et ♀: Supra sordide testacei, subtus fusci, ad partem luteo-variegati; capite utrimque et postice, pronoto mesonoto in partibus lateralibus, apice lineaque media, nec non venis tegminum ex parte luteis, ex parte fuscescentibus; fronte nigra, marginibus lineaque transversa ante medium sita flavidis ornata, vel flava, fasciis duabus, una basali, altera media, nigricantibus praedita; dorso abdominis nigro, utrimque late albido-vittato; tegminibus subhyalinis, venis apicem versus infuscatis; pedibus fuscescentibus, geniculis marginibusque luteis. — Long. corp. 2,5-3,5, cum tegm. 3,7-4,5; lat. meson. 4,2-1,4 mm.

Patria: Provincia Bonaerensis.

De esta singular especie posee el Museo Público un ♂, y yo una ♀ y una pseudo-imágen; todos los ejemplares provienen de Chacabuco, y han sido descubiertos por el Sr. D. FÉLIX LYNCH.

La pseudo-imágen es de un testáceo claro, provista de dos fajas congtitudinales amarillas en cada témina rudimentaria y de una en cada lado del dorso abdominal; del mismo tinte amarillo ó fulvo son las márgenes de la cabeza, los bordes laterales del pronoto y mesonoto y la carena media de la frente, cuya mitad superior es negra, adornada de la línea transversal blanquiza bien marcada. Las partes laterales del esternón son negruzcas y el vientre es fuscescente, con la base y el ápice testáceos.

(Continuará).