

Berg 1884c)

Jan/60 Berg, C. 1884c). Hemiptera Mendozanae
Addenda et Emendanda ad Hemiptera Argentinae p. 1-178

137. ***Derotettix mendosensis* BERG.**

Derotettix mendosensis BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. XIV, p. 47. 11 et Contr. Cie. Arg. p. 12. 11 (1882).

El único ejemplar de esta chicharra, que sirvió para establecer el nuevo género, y que fué descubierto por el Dr. BURMEISTER en Mendoza, se encuentra en el Museo Público de Buenos Aires.

Fam. FULGORIDAE.

○ Subf. FULGORINA.

○ Gen. LATERNARIA LINN., STÅL.

✓ ♂ 138 (257). ***Laternaria lucifera* (GERM.) BERG.**

He examinado el ejemplar típico de esta especie en el Museo Real de Berlin, y puedo afirmar con certeza que la sinonimia dada por mí anteriormente es válida.

○ Gen. PHENAX GERM.

Phenax GERM. in SILB., Rev. Ent. I, p. 175 (1833).

BURM., Handb. II, 1, p. 167. (1835) et Gen. Ins. 20 (1840). — BLANCH., Hist. des Ins. III, p. 170 (1840). — AM. et SERV., Hém. p. 498 (1843). STÅL, Hem. Afr. IV, p. 135 (1866) et Stett. Ent. Zeit. XXXI, p. 287 (1870).

○ *Eumallia* GUÉR., Voy. aux Ind. Orient. par Bél. Zool. p. 451 (1834).

○ *Phaenax* SPIN., Anal. Soc. Ent. de Fr. Sér. 1. VIII, p. 316 (1839).

✓ ○ 139. ***Phenax variegata* (OLIV.) GERM.**

♀ *Fulgora variegata* OLIV., Ent. Méth. VI, p. 375. 30 (1791). — GERM. in THON, Ent. Arch. II, 2, p. 46. 9 (1830).

Phenax variegata GERM. in SILB., Rev. Ent. I, p. 175. 3 (1833). — BURM., Handb. II, 1, p. 167. 1 (1835). — BLANCH., Hist. des Ins. III, p. 170. pl. 12, fig. 3 (1840). — AM. et SERV., Hém. p. 498. 1 (1843). — WALK., List of Hom. II, p. 335. 1 (1851).

○ *Eumallia variegata* Guér., Voy. aux Ind. Orient. par Bél. Zool. p. 181 (1834).

○ *Phaenax reticulata* SPIN., Anal. Soc. Ent. de Fr. Sér. 1. VIII, p. 316 (1839). STOLL, Cig. fig. 45 (1788).

Patria: Brasilia. — Republica Uruguayensis.

En el Museo Real de Berlin se halla una pseudo-imagen de esta especie, coleccionada por SELLOW en Montevideo. Al enumerar los hemípteros argentinos, he tomado siempre en cuenta los de la vecina República Oriental, de manera que lo hago tambien respecto á esta especie.

✓ ○ Subf. DICTYOPHARINA.

✓ ○ Gen. DICTYOPHARA GERM.

✓ ♂ 140. ***Dictyophara polynoeura* n. sp.**

♂ et ♀: Flavescens-virides, ex parte flavidus aut aurantiaci, tegminibus processuque capitis apices versus, segmento anali abdominis, femoribus ad basin et tibiis ad apicem tarsisque viridibus; processu capitis longe producto, latitudine verticis triplo longiore, valido, sensim acuminato, supra tri- et infra quinquecarinato, carinis mediis subobsoletis, ad latera tantum in mare prope oculos obsoletissime carinato; tegminibus, areis ulnaribus radialibusque et costa a pterostigmate exceptis, dense, praecipue limbus versus, reticulatis. — Long. corp. cum proc. capit. 12-13, capit. cum proc. 2,5-3, tegm. 9-10; lat. meson. 2,5, part. post. tegm. 5-6 mm.

Caput cum processu modice ascendens, hoc apice obtuso, supra concaviusculo, infra sat concavo; vertice oculo triplo fere latiore, basi parum marginato; fronte cum marginibus quinquecarinata; clypeo medio marginibusque carinato; rostro ultra coxas posticas extenso, articulo terminali praecedente aequilongo. Oculi mediocres, elongati. Pronotum medio carinatum, antice inter oculos rotundato-productum et modice marginatum, postice late

triangulariter excisum. Mesonotum carinis tribus fere parallelis et percurrentibus instructum. Tegmina virescenti-hyalina, venis ex parte viridibus, ex parte testaceis, pterostigmate concolori, multiaareolato. Alae ad limbum multiareolatae. Pectus abdomenque aurantiaca aut virescentia. Tibiae posticae extus spinis quattuor vel quinque et apice octo armatis.

Patria: Respublicae Argentina et Uruguayensis.

Muy característica por el proceso de la cabeza bastante válido y acuminado, y sobre todo por las tegminas sumamente reticuladas en toda su extensión, con excepción de las áreas ulnares y radiales y de la costa hasta el pterostigma.

Poseo tres ejemplares, de los cuales recibí uno muy defectuoso y descolorido, en aguardiente, del Dr. D. ADOLFO DOERING, coleccionado en la Sierra de Córdoba, y recogí los dos otros en la Banda Oriental del Uruguay, en las orillas del Río Maciel, en el mes de Febrero.

♂ Subf. CIXIINA.

♂ Gen. OLARIUS STÅL.

♂ 141. **Oliarius transitorius** n. sp.

♂: Piceus, subopacus, carinis marginibusque capitis, frontis, clypei, pronoti, mesonoti ex parte, pectoris abdominisque, venis tegminum, geniculis pedum, tibiis ad partem tarsisque, nec non lobulis analibus, plus minusve testaceis; carina laterali mesonoti sat infuscata, carina sublaterali vel submedia sat obsoleta et antice valde abbreviata; venis tegminum fusco-granulatis, setigeris, venulis transversis et margine commissurali prope apicem clavi fuscis. — Long. corp. 3, cum tegm. 4; lat. 1,1 mm.

Vertex capitidis fere aequa longus ac latus, antrorsum vix angustatus, concavus, postice triangulatiter excisus, carinis apicalibus triangulum fin-

gentibus. Frons et clypeus ad unum aream ovalem, lenissime convexam, medio et ad marginem carinatam fingentes. Rostrum coxas intermedias paullo superans. Pronotum capite vix latius, brevissimum, postice valde lateque excisum. Mesonotum capite paullo latius, carinis media et lateralí percurrentibus, submedia multo lumiore, antice abbreviata. Tegmina hyalina, venis ad limbum dense granulatis, radiali mox ante medium et ulnari interiori sat longe ante medium furcatis, pterostigmata maximam ad partem niveo. Alae venis infuscatis praeditae. Lobuli laterali-anales oblongi, conjuncti; lobulus medius parvus, acuminatus. Tibiae posticae extus bi-vel tridentatae et apice sexdentatae.

Patria: Respublica Uruguayensis.

Es una especie semi-transitoria entre los géneros *Hyalesthes* SIGN. y *Oliarius* STÅL, teniendo el mayor número de caracteres de este último, sobre todo las once celdillas apicales de las tegminas, las tres espinas en la mitad basilar de las tibias posteriores y las fosetas terminales del vértice bien determinadas por las carenas salientes. Se acerca al *Hyalesthes* por las carenas intermedias del mesonoto desvanecidas y anteriormente interrumpidas y por la frente muy poco separada del clipeo, por ser la sutura apénas indicada. El ojo simple en la parte sutural de la carena allí no bifurcada, es bien visible.

Poseo un solo ejemplar que he recogido en la Banda Oriental del Uruguay, cerca del Río Corralito, á fines de Febrero de 1883.

♂ Gen. CIXIOSOMA BERG.

Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 185 et Hem. Arg. p. 220 (1879).

♂ 142. **Cixiosoma bonaërense** n. sp.

♂ et ♀: Fuscescentes, ex parte lutei aut sordide lutei ad partem infuscati, marginibus carinibusque partium diversarum corporis et interdum pectore pedibusque pallidioribus; tegminibus subhyalinis, granulis, infuscatione obliqua costali-basali, fa-

scia obliqua media, illius ad costam approximata vel convergente, fasciaque ex parte obsoleta sublimbali, cum praecedente ad costam divergente, nec non vittula subobliqua limbali fuscis (fasciis tribus vittulaque figuram \ / \ — fornante). — Long. corp. 3,2-3,7, cum tegm. 4,5-5,4; lat. meson. 4,4-1,3 mm.

Vertex fere aequo longus ac latus, medio marginibusque distincte carinatus, carinibus transversis obsoletis, margine postico late rotundato-sinuato. Frons utrimque non sed apice valde sinuata et ampliata, cum clypeo distincte carinata. Rostrum coxas posticas superans. Mesonotum fuscum, carinis antrorum modice convergentibus, carina media apice abbreviata. Tegmina valde granulata, picturis interdum obsoletis aut interruptis. Alae vitreae. Abdomen saepe obscure fuscum, segmentorum marginibus segmentoque anali testaceis. Pedes colore variables, fuscescentes, lutei, testacei, ex parte fusco luteoque variegati; tibiis posticis generaliter pallidioribus.

Patria: Provincia Bonaerensis.

Se distingue del ^o*Ciclosoma platense* BERG por el cuerpo menos esbelto, por el vértice algo mas corto, por la trompa mas larga, por la coloracion mas oscura en general y en particular por las fajas fuscas de las tégmias.

Los ejemplares que poseo fueron recogidos por el Sr. D. FÉLIX LYNCH en Chacabuco, y por mí en Buenos Aires.

✓^o Subf. OMMATIDIOTINA BERG.

✓^o *Issida* (partim) STÅL, Hem. Afr. IV, p. 131 et 202 (1866).
✓^o *Ommatidiotus* FIER., Rev. et Mag. de Zool. Sér. 3. III, p. 359 et Cicad. d'Europ. p. 75 (1875).

✓^o PLAGIOPSIS n. gen.

Caput multo latius quam longius; vertice admodum latiore quam longiore, antice obsolete pentagonalis,

humiliore, medio subarcuatim transverso-impreso, pone impressionem subcarinato et margine postico carinato; leniter sinuato; fronte transversa, dimidio latiore quam longiore, subpentagonalis, margine basali subrecto, angulo medio obsoletissimo, marginibus lateralibus arcuatis, carinato-elevatis, carina media longitudinali distincta; clypeo medio vix vel tantum basi apiceque carinato; spatio discreto inter frontem et clypeum nodulis ocelliformibus quattuor, et parte ante temporali vel latero-frontali extus intusque carinata, nodulis plurimis ex parte in series duas dispositis instructis. Rostrum coxas intermedias paullo superans, articulo terminali brevi. Oculi oblongi, infra vix sinuati. Ocelli desunt. Antennarum articulo basali brevi, secundo majusculo, subgloboso, tuberculato. Pronotum antice arcuatum, ad vel ultra medium oculorum antrorum productum, medio subcarinatum, postice in mare sat profunde exciso-sinuatum, in femina leviter lateque sinuatum. Mesonotum haud carinatum, medio linea longitudinali subimpressum, utrumque ut in lateribus pronoti ocellato-punctatum, postice longe productum et utrumque sinuatum. Tegmina subcoriacea, sectoribus tribus e venula basali communi orientibus simplicibus, raro duabus interioribus venulis transversis, una ante, altera pone medium, praeditis, ante limbum venulis transversis duabus conjunctis, cellulis apicalibus quatuor, quibus secunda parva, e bifurcatione venulae secundae formante, venula furcata clavi sat longe petiolata. Pedes simplices; tibiae posticae mox pone medium unispinosae, apice sexspinosae, spinis lateralibus magnis; tarsis posticis longitudine dimidio tibiae, articulo basali oblongo, incrassato, duobus sequentibus aequilongo.

Solo lo puedo comparar con el género *Ommatidiotus* SPIN., por la forma general y por la del vértice y del pronoto, y por la estructura de las tégmias. Se distingue del mismo por la frente

transversal y su estructura, por la impresión del vértice, por la sinuosidad posterior del pronoto del macho, por la carencia de las carenas del mesonoto, su ápice prolongado, sus márgenes postero-laterales sinuadas y sus partes laterales, como en el pronoto, ocelado-punteadas, por la serie simple de celdillas apicales en las téglomas, y por las tibias posteriores mas largas y su tarso basilar oblongo y mas largo.

La frente es muy particular, representándose como una placa transversal, algo convexa, carenada en el medio y en sus bordes y separada en los lados por un espacio subfrontal ó subtemporal, exteriormente carenado; en este último, entre el ojo y la carena marginal de la placa y entre esta y el clipeo, se encuentran los nódulos oceliformes, parecidos á los de las partes laterales del pronoto y mesonoto.

✓ 143. **Plagiopsis Distanti** n. sp.

♂ et ♀: Supra sordide testacei, subtus fusi, ad partem luteo-variegati; capite utrimque et postice, pronoto mesonoto in partibus lateralibus, apice lineaque media, nec non venis tegminum ex parte luteis, ex parte fuscescentibus; fronte nigra, marginibus lineaque transversa ante medium sita flavidis ornata, vel flavidula, fasciis duabus, una basali, altera media, nigricantibus praedita; dorso abdominis nigro, utrimque late albido-vittato; tegminibus subhyalinis, venis apicem versus infuscatis; pedibus fuscescentibus, geniculis marginibusque luteis. — Long. corp. 2,5-3,5, cum tegm. 3,7-4,5; lat. meson. 1,2-1,4 mm.

Patria: Provincia Bonaerensis.

De esta singular especie posee el Museo Público un ♂, y yo una ♀ y una pseudo-imágen; todos los ejemplares provienen de Chacabuco, y han sido descubiertos por el Sr. D. FÉLIX LYNCH.

La pseudo-imágen es de un testáceo claro, provista de dos fajas longitudinales amarillas en cada tégloma rudimentaria y de una en cada lado del dorso abdominal; del mismo tinte amarillo ó fulvo son las márgenes de la cabeza, los bordes laterales del pro-

noto y mesonoto y la carena media de la frente, cuya mitad superior es negra, adornada de la línea transversal blanquizca bien marcada. Las partes laterales del esternón son negruzcas y el vientre es fuscante, con la base y el ápice testáceo.

° Subf. DELPHACINA. (*)

Gen. BERGIA SCOTT.

SCOTT, Ent. Monthl. Mag. XVIII, p. 155 (1881).

REUT., Zool. Jahresber. für 1881. II, p. 283 (1882).

° 144 (275). **Bergia nimba** (BERG) SCOTT.

° *Liburnia nimba* BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 191. 275 et Hem. Arg. p. 226. 275 (1879).

Bergia nimba SCOTT, Ent. Monthl. Mag. XVIII, p. 155 (1881).

Un ejemplar recogido posteriormente por el Sr. GÜNTHER en Buenos Aires, es mucho mas oscuro que el típico, pero por lo demás correspondiente á los caracteres generales y esenciales.

° IDIOSYSTATUS n. gen.

Caput modice productum; vertice aequilateraliter triangulari, postice perparum exciso, marginibus lateralibus valde elevatis, carina media antice abbreviata; fronte obovali, fere duplo longiore quam latiore, carinis duabus cum marginibus carinatis parallelis instructa; clypei medio marginibusque carinatis. Oculi mediocres, infra sat profunde sinuati. Ocelli parvi. Antennae breviusculae, articulo secundo primo duplo fere longiore. Pronotum trapezoidale, integre tricarinatum, postice late triangulariter sinuatum. Mesonotum quinque-

(*) Al enumerar los representantes de esta subfamilia en mi *Hemiptera Argentina*, he colocado tres especies en géneros á que no pertenecen, por falta de las obras modernas de FIEBER y de material de comparación. Ahora, en poder de las primeras y además por haber examinado solícitamente el Sr. D. J. SCOTT todas mis especies típicas, vuelvo á disponerlas de nuevo.

carinatum, carinis laterali et intermedia postice arcuatim conjunctis, illa ad marginem posticam mesonoti extensa, apice triangulariter producto. Tegmina subhyalina, venis granulatis et setigeris, tantum sectore primo in medio tegminis bifurcato, cellulis apicalibus sex vel septem, venula tertia apicali bifurcata. Pedes mediocres; tibiis posticis ad latera trispinosus; calcari parvo; tarsorum posticorum articulo basali secundo duplo fere longiore.

Se coloca entre *Bergia* SCOTT é *Idiosemus* BERG, teniendo cierta semejanza con los dos. Se distingue del primer género, por el cuerpo angosto, por el vértice mas prolongado y triangular, por la frente mucho mas larga y por sus carenas integras, por la carena media del clipeo, por las antenas mas cortas y las carenas mas salientes del pronoto y mesonoto y las laterales posteriormente unidas en este último. Difiere del *Idiosemus*, por el cuerpo mas ancho, por la cabeza muy poco prolongada, por el vértice en forma de triángulo equilátero, por la frente obovoidal, por los ojos inferiormente mas escotados, las antenas mas gruesas y menos largas, y por las cinco carenas del mesonoto. La estructura de las tegminas es casi como en este último género.

♂ 145. *Idiosystatus acutiusculus* (?) BERG.

♀: Sordide testacea, vertice inter carinas, maculis discoidalibus oblongis flavidis exceptis, fronte, fascia obsoleta et arcuata media flava, carinis apice exceptis, clypeo inter carinas, maculis discoidalibus oblongis apice exceptis, pronoto basi, ad carenas et punctis duobus medio-sublateralibus, mesonoto, carinis apice exceptis, granulis tegminum, dorso abdominis ad partem, basi articulorum antennarum, maculis pectoris coarumque, basi ventris, striolis femorum tibiarumque, nec non tarsis ad partem, fuscis vel nigris.— Long. corp. 3,5, cum tegm. 4-4,2; lat. meson. 4 mm.

Patria : Patagonia (Rio Santa Cruz).

♂ ? *Delphax acutiuscula* SPIN. in GAY, Hist. de Chile. Zool. VII, p. 258. 1 (1852).

Es muy probable que la especie que tengo á la vista, es la *Delphax acutiuscula* SPIN.; en contradiccion están solo el vértice, que en la especie de SPINOLA es, segun la descripción, si bien la entendamos, dos veces mas largo que ancho en su base, y el clipeo (caperuza de este autor), no lleva una carena media. Si la especie chilena es otra, pertenecerá tambien por los caracteres indicados y otros, á un género diferente, de manera que el nombre específico adoptado por mí, no ha de dar lugar á confusiones.

Los dos ejemplares que conserva el Museo Pùblico, fueron recogidos por mí en las barrancas altas del Rio Santa Cruz, el 9 de Octubre de 1874.

♂ *Idiosemus* n. gen.

Corpus longiusculum, antrorum retrosumque attenuatum. Caput ante oculos longe triangulariter productum; vertice planiusculo, latitudine basis plus quam duplo longiore, sensim acuminato, marginibus alte carinatis, medio carina percurrente instructo, margine postico in medio angustissime sinuato; fronte lanceolata, interdum convexiuscula, medio haud carinata, apice truncata, carinis lateralibus et marginibus sat elevatis; clypeo medio marginibusque carinato. Antennae mediocres, teretes, articulo secundo primo quadruplo longiore. Oculi infra perparum sinuati. Pronotum et mesonotum planiuscula, hoc quadricarinatum, carinis mediis postice paullo abbreviatis, apice obtuso sat longe producto, illud carinis tribus percurrentibus instructum, margine postico late triangulariter sinuato et medio ut in vertice angustissime exciso. Tegmina oblonga, diaphana, apice haud ampliata, inervatio fere ut in *Bergia* SCOTT: vena radiali prima (sector primus) tantum in medio tegminis bifurcata, et venula tertia apicali etiam solum bifurcata. Pedes breviusculi; tibiis posticis ad latera trispinosus, apice sexspinosis; tarsis tibia multo brevioribus.

Muy parecido al género *Tropidocephala* STÅL (*Nephropsia* A. COSTA), distinguiéndose del mismo principalmente por la falta de la carena media de la frente, por las cuatro carenas del mesonoto, por el segundo artículo de las antenas mas largo, por los ojos inferiormente ménos sinuosos, por tener las tibias tres espinas laterales, por los tarsos posteriores mas cortos, por los dos nervios (segundo y tercer sector) de las tégminas no furcadas y por tener solo bifurcado el tercer nervio apical.

♂ 146 (273). *Idiosemus Xiphias* BERG.

♂ † *Liburnia Xiphias* BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 170. 273 et Hem. Arg. p. 225. 273 (1879).

♀ *Nephropsia Xiphias* SCOTT in litt.

Esta especie, la que me había determinado STÅL como *Liburnia* y SCOTT como *Nephropsia*, queda ahora atribuida al nuevo género *Idiosemus*.

La he observado últimamente en muchos ejemplares en la Banda Oriental del Uruguay; el Museo Público la posee tambien del Río Negro de Patagonia, donde la coleccióné en el mes de Diciembre de 1874.

La larva y la pseudo-imágen son de color amarillo testáceo, superiormente blanquizcas, provistas de una faja longitudinal lateral, que se extiende desde el ápice de la prolongación cefálica hasta el segmento anal del abdomen, pasando por el medio de las vainas de las tégminas. El pronoto, mesonoto y metanoto, llevan cuatro carenas percurrentes, y se ve una carena de vez en cuando interrumpida en el dorso abdominal, guarneida de una línea fuscante en los dos lados. La frente es como en la imagen.

Vive en la *Baccharis coridifolia* DC.

♂ Gen. MEGAMELUS FIEB.

Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. XVI, p. 519.
tab. 8, fig. 2 (1866); Rev. et Mag. de Zool. Sér.
3. III, p. 369 et Cicad. d'Europ. I, p. 82 (1875).

♂ 147. *Megamelus scutellaris* n. sp.

♀: Testaceo-flavida, mesonoto utrimque et postice, hemelytrorum basi, apice clavi venuisque transversis ex parte, frontis fasciis basali obsoleta et subapicali lata, coxarum annulo medio, femorum apice obsolete, tibiarum anticarum intermediarumque annulis basali apicalique et posticarum basi, nec non tarsorum apice, brunneis vel dilute fuscis; dorso abdominis ventreque sordide aurantiacis, hoc margine laterali obsolete fusco-maculato. — Long. corp. 3,5, cum tegm. 4,5; lat. meson. 4 mm.

Caput admodum productum; vertex antice alte carinatus, postice in angulum latissimum et brevissimum productus; fronte distincte tricarinata, apice subsinuata et ante marginem carina triangulari instructa; clypeus convexiusculus, carina media basi nonnihil abbreviata. Rostrum coxas intermedias superans, articulo apicali praecedente paullo breviore. Pronotum basi lateribusque obsolete infuscatum. Mesonotum utrimque valde infuscatum, carinis lateralibus et media in depressione obsoletis, apice late triangulari. Tegmina hyalina, infuscatione basali apicalique clavi dilute brunneis, venuisque transversis in medio tegminis et ejus angulo interno limbali parum fuscenscentibus.

Patria: Corrientes.

Esta especie, recogida por mí en Corrientes á fines de Diciembre de 1876, es fácil de reconocer por la coloración y los dibujos, que la distinguen bien de sus pocos congéneres europeos.

♂ Gen. STENOCRANUS FIEB.

Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. XVI, p. 519.
tab. 8, fig. 3 (1866); Rev. et Mag. de Zool. Sér.
3. III, p. 370 et Cicad. d'Europ. I, p. 83 (1875).

○ 148 (269). **Stenocranus maculipes** (BERG) SCOTT.

▷ † *Delphax maculipes* BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 187. 269 et Hem. Arg. 223. 269 (1879).
Stenocranus maculipes SCOTT in litt.

No ha sido observada despues de su descripcion.

○ Gen. EUIDES FIEB.

Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. Wien. XVI, p. 519.
tab. 8, fig. 7 (1866); Rev. et Mag. de Zool. Sér.
3. III, p. 373 et Cicad. d'Europ. I, p. 86 (1875).

○ 149. **Euides fusco-vittata** SCOTT.

Euides fusco-vittata SCOTT, Ent. Monthl. Mag. XVIII, p. 155 (1881).

Patria: Provincia Bonaerensis.

El ejemplar típico, originario de Buenos Aires, se encuentra en mi colección, y aun otro, tambien ♀, que me ha sido enviado de Chacabuco por el Sr. LYNCH, y que es en todo mucho mas oscuro que el primero, principalmente en cuanto á la infuscacion de la parte terminal del clavo.

○ 150. **Euides fucata** n. sp.

♂: Dilute piecus, ad partem, praesertim capite, pronoto, mesonoto pedibusque, sordide testaceus; tegminibus vitta lata oblique percurrente et altera brevi antico-limbali fuscis ornatis; connexivo maculis parvis flavidis praedito. — Long. corp. 3,3, cum tegm. 5; lat. meson. 1,4 mm.

Caput perparum productum; vertice carinis obsoletis instructo; fronte medio impressa et ibidem carina media obsoleta, carinis marginalibus distinctis; clypeo ad basin medio obsoleto carinato. Pronotum carinis albidis ornatum, postice levissime latissimeque triangulariter sinuatum. Mesonotum

sat distincte tricarinatum, postice impressum et obtusiuscule productum. Tegmina ad partem vitrea, vittis fuscis insignissimis ornata, vitta longa in cellula media interiore pallidiore. Alae vitreae. Pedes sordide testacei, hic illuc perparum infuscati.

Patria: Provincia Bonaerensis.

Poseo un solo individuo de esta especie, recogido en Chacabuco por el Sr. LYNCH; que es muy característica por las dos fajas longitudinales oscuras de las tegminas y por la frente algo deprimida en su parte media, con la carena allí desvanecida.

○ Gen. LIBURNIA STÅL.

FIEB., Rev. et Mag. de Zool. Sér. 3. III, p. 376 et
Cicad. d'Europ. I, p. 89 (1875).

○ 151 (271). **Liburnia Bergi** SCOTT.

▷ *Liburnia Bergi* FIEB., Ent. Afr. Afril. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 188.
271 et Hem. Arg. p. 224. 271 1879.
Liburnia Bergi SCOTT, Ent. Monthl. Mag. XVIII, p. 156 (1881).

A causa de una denominacion ya anteriormente empleada, ha sido cambiado el nombre por el Sr. SCOTT.

Anotacion. — Las demás especies del género *Liburnia*, enumeradas ó descritas por mí, á saber: *L. patruelis* STÅL, *L. univittata* BERG, *L. nigricula* BERG y *L. fusco-terminata* BERG, están genéricamente bien colocadas.

✓ ○ Subf. ISSINA BERG.

▷ *Issida* (partim) STÅL, Hem. Afr. IV, p. 131 et 202 (1866). —
FIEB., Rev. et Mag. de Zool. Sér. 3, III, p. 362 et Cicad. d'Europ.
I, p. 75 (1875).
Issina BERG, Anal. Soc. Cien. Arg. VIII, p. 209 et Hem. Arg.
p. 228 (1879).

✓ ♂ Gen. FALCIDIUS STÅL.

Hem. Afr. IV, p. 205 (1866).

✓ ♂ 152. **Falcidius lyra** (BURM.) n. sp.

♂ et ♀ : Nigro-picei, nitidi, linea media capitis antice in fronte abbreviata sed postice per pronotum, mesonotum et suturam tegminum, hic atque adeo apicem versus multo latiore, continuata, altera media tegminis bisinuata, cum opposita figuram lyrae singente, nec non costa tegminum, dorso abdominis in medio pedibusque ex parte, sordide flavis. — Long. corp. cum tegm. 4,5; lat. pron. 2 mm.

Caput valde declive; vertice laeviusculo, postice modice sinuato, antice subarcuato-carinato; fronte alutaceo-rugosa, marginibus infra oculos late rotundatis, apice sinuata; clypeo obtuso, linea media flavida obsoleta ornato. Pronotum medio obsolete carinatum, in margine postico medio vix obsoletissime sinuatum. Mesonotum utrimque leniter biimpressum et in impressione ante apicem perparum transverso-rugulosum. Tegmina alutacea, sutura clavi distinctissima, venis obsoletis. Alae rudimentariae. Pedes ex parte picei ex parte testacei, obscure marginati; tibiis apicem versus tarsisque pallidioribus, illis in dimidio terminali extus bispinosis, horum articulo basali medriocre.

Patria: Republica Argentina (Entre Ríos).

Issus lyra BURM. in Mus. Pub.

Los dos ejemplares que me sirven para la fundacion de esta especie muy característica por el dibujo, conserva el Museo Público, y han sido recogidos en la Concepcion del Uruguay por el Dr. D. ADOLFO DOERING.

En el Museo Real de Berlin se encuentran dos ejemplares de la misma especie, como colecciónados por REICH en Buenos Aires;

provendrán probablemente de otra parte de la República Argentina, por no haber sido hallados por nosotros nunca en Buenos Aires.

✓ ♂ Subf. FLATINA.

✓ ♂ Gen. ORMENIS STÅL.

✓ ♂ 153 (279). **Ormenis Cestri** BERG.

La larva y pseudo-imagen que viven en la *Acacia Farnesiana* WILLD., son de un verde muy claro y están provistas de una materia farinácea blanca y adornadas de dos pequeñas manchas negras en el dorso abdominal, cerca de su ápice. El vértice de la cabeza lleva una carena que se extiende sobre el pronoto y mesonoto, cambiando en un surco en los ejemplares que están próximos á la transformacion en la imagen.

Se hallan en el mes de Noviembre.

♂ Fam. CERCOPIDAE.

♂ Subf. CERCOPINA.

♂ Gen. TOMASPIS AM. et SERV.

♂ 154 (288). **Tomaspis terrea** (GERM.).

♂ † *Cercopis terrea* GERM., Mag. der Ent. IV, p. 46. 17 (1821).

♂ † *Monecphora? terrea* WALK. List of Hom. III, p. 685. 35 (1851).

♂ * *Tomaspis argentina* BERG, Anal. Soc. Cient. Arg. VIII, p. 217. 288 et Hem. Arg. p. 236. 288 (1879).

La sinonimia queda establecida segun el examen de cuatro ejemplares provenientes de Montevideo, que se encuentran en el Museo Real de Berlin, y que deben haber sido comparados con los típicos del primer autor.