

quam tertia parte facie occupante. Rostrum coxas posticas attingens. Pronotum antice admodum angustum, marginibus lateralibus medio vix sinuatis, impressionibus, macula laterali ex parte interrupta et alteris duabus anticis posticisque per lineas longitudinales medias conjunctis, nigris. Scutellum leviter sinuato-excisum. Tegminum costa obsoletissime spinulosa, area basali ad margines infuscata, spatio inter venam marginalem postcostalem et ramum ulnarem postcostalem jacente apicem versus haud ampliata, membrana apud venulas primas transversas nonnihil infuscata. Alarum venis apicem versus fuscis. Opercula majuscula, valde approximata, postice late rotundata, fere semicircularia. Segmentum paenultimum retrorsum angustum, sat longum, apice vix sinuatum. Pedes infra fuscescenti-lutei; femoribus anticis spinis duabus validiusculis armatis.

Patria: Provincia Cordubensis.

Parecida al *T. elegans* BERG en cuanto á la organizacion general y los dibujos de la cabeza, del pronoto y del mesonoto. Se distingue del mismo principalmente por la cabeza mas ancha, los ojos y los opérculos mas grandes, la costa menos espinosa, el pronoto lateralmente menos sinuoso, la coloracion oscura del dorso abdominal, la carencia de las manchas oscuras en las tegminas y sus nervios diferentes en su coloracion, y por las patas no estriadas.

Poseo un solo ejemplar que debo al Dr. D. H. STEMPPELMANN.

Anotacion. — En la ♀ del *Tympanoterpes elegans* BERG, el sexto segmento ventral tiene en el medio una escotadura triangular bastante profunda y una sinuosidad á cada lado, siendo su parte lateral saliente, ancha y redondeada.

La especie recien descrita (*T. cordubensis*) y esta (*T. elegans*), se alejan del género *Tympanoterpes* por el espacio casi linear que se halla entre el nervio marginal postcostal y la rama ulnar postcostal, sin colocarse por esto en algun otro género con mayor precision.

Fam. FULGORIDAE.

✓ ♂ 225. *Dictyophara suturalis* (GERM.).

✓ ♂ *Flata suturalis* GERM. in THON, Ent. Arch. II, 2, p. 48. 22 (1830).
✓ ♂ *Nersia suturalis* STÅL, Rio de Jan. Ilm. II, p. 65 (1861).

Patria: Brasilia.—Respublica Uruguayensis.

Varios ejemplares traídos de la Banda Oriental del Uruguay, por el Dr. SPEGAZZINI, pertenecen á esta especie, por lo que se deduce de la descripcion breve de GERMAR, á la que agrego las observaciones siguientes:

El vértice de la cabeza es mas ancho que largo y algo mas largo que el pronoto, y de mayor diámetro en la parte apical que en la basilar, sin carenas, ó provisto de dos pequeños tubérculos discoidales y una carena longitudinal en el medio sumamente desvanecida; su centro es mas ó menos verde.

La frente sinuada en los lados y en el ápice y dilatada hacia el clipeo, es verde, con la base y los bordes fuscos ó parduzcos, y tiene las tres carenas bastante bien marcadas, paralelas y desvanecidas en la base y ápice, con excepcion de la media que sigue continuando como carena media del clipeo.

El pronoto muy angosto es anteriormente verde, con la carena media bien marcada. El mesonoto, que está adornado de siete manchas verdes (cuatro discoidales, dos laterales y una apical), tiene las tres carenas en parte verdes bastante pronunciadas, siendo las laterales anteriormente muy convergentes y posteriormente abreviadas.

Las tegminas son hialinas, con excepcion de los nervios, de la sutura, del limbo y del estigma, que son fuscos, siendo la infuscacion del limbo bastante ancha y oscura, y la del estigma blanqueado muy claro, amarillenta; el tercio apical consta de tres series de celdillas.

El color general del tórax, esternon y abdómen es de un fuscó amarillento variado, en parte verdoso; son de color verde, fuera de las partes ya indicadas, algunas aristas del esternon, el borde, unas manchas basi-laterales y una linea longitudinal del dorso abdo-

minal, una línea longitudinal del vientre y en parte las patas; los fémures, sobre todo los posteriores, son en algunos ejemplares muy oscuros; las tibias poseen cuatro espinas laterales, de las cuales una en la base, y ocho apicales.

○ Fam. CERCOPIDAE.

○ Gen. PHILAENUS Stål.

Stål, Stett. Ent. Zeit. XXV, p. 66 (1864) et Hem. Afr. IV, p. 68 et 77 (1866).

Fieb., Rev. et Mag. de Zool. Série 3. III, p. 382 et Cicad. d'Europ. p. 95 (1875).

○ 226. **Philaenus xanthaspis** n. sp.

♀: Testaceo-lutescens, ex parte flavida et infuscata, sat dense sericea, subtus cum pedibus, disco frontis ventrisque exceptis, flavida; vertice, fronte ex parte, pronoto antice et praecipue scutello, ochraceis; dimidia postica pronoti maculaque tegminum obsoletissima quae figuram < apud marginem interiorem valde apertam singit, dilute fuscescentibus; punctis duobus apicalibus linea que media transversa vetricis, vitta media lata striolisque sex vel septem lateralibus frontis, dorso abdominis, marginibus exceptis, discoque ventris, nigris; alis sordide hyalinis, venis nigris. Long. 6; lat. hum. 2 mm.

Caput rotundato-angulatum; vertice planiusculo, linea media transversa impressa et ante apicem utrimque sulco subtili arcuato instructo, sulco loborum anticorum sat obsoleto; fronte convexa, ad latera striolata; clypeo convexo, ad coxas anticas extenso. Ocelli inter se quam ab oculis multo magis remoti. Pronotum vertice duplo et dimidio longius, antice obsolete quinque impressum, margine antico late rotundato, mar-

ginibus lateralibus anticis diametro transverso oculorum nonnihil brevioribus. Scutellum nonnihil longius quam latius, marginibus lateralibus leniter sinuatis. Hemelytrorum marginibus costali et interno fere parallelis, apice angulato-rotundato.

Patria: Buenos Aires.

Característico por la coloración muy amarilla del escudillo, los dos puntos negros apicales del vértice y los bordes latero-anteriores muy cortos del pronoto.

El *Cephisus siccifolius* (WALK.) Stål, y esta nueva especie, son las únicas que se conoce hasta ahora como representantes de la subfamilia *Aphrophorina* en la República Argentina.

Un ejemplar recogido por el Rev. Padre F. MEISTER.

○ Fam. JASSIDAE.

○ 227. **Athysanus vittulatus** n. sp.

♀: Supra sordide virescenti-flavida, subtus maximam ad partem prasina; maculis duabus oblongis subtransversis vetricis, lineolis lateralibus transversalibus frontis intus cum lineis duabus longitudinalibus conjunctis, clypeo, genis extus, fascia postmedia sat lata pronoti, fasciola media scutelli, costa vittisque quinque tegminum, disco dorsi abdominis, nec non tibiis anticus totis et intermediis supra tantum, nigris vel piceis. — Long. 5-5,5; lat. pron. 1,3 mm.

Caput obtuse rotundatum; vertice sat lato, punctis duobus basalibus valde distantibus infuscationeque apicali ornato; fronte convexiuscula, medio linea flava basin versus angustata praedita. Pronotum vertice duplo fere longius, pone medium transversim striolatum, postice late leviterque sinuatum. Scutellum basi infuscatum. Tegmina sordide hyalina, venis subtilibus, costa, parte