

157 — **Tigava rolliniae** Drake & Hambleton, 1934

Em *Rollinia sylvestris*, Minas Geraes.

386.

Ord. HOMOPTERA

Subord. AUCHENORHYNCHA

♂ Superfam. CICADOIDEA

♂ Fam. CICADIDAE

♂ Subfam. GEANINAE

♂ 158 — **Carineta fasciculata** (Germar, 1830)

♂ 159 — **Fidicina drewseni** (Stal, 1854).

♂ 160 — **Fidicina mannifera** (Fabr., 1803).

♂ 161 — **Fidicina pullata** (Berg, 1879).

♂ 162 — **Quesada sodalis** (Walker, 1851)

As fórmas jovens destas cigarras atacam as raízes do cafeiro.
S. Paulo.

518, 669, 27, 457.

♂ Superfam. FULGOROIDEA

✓ ♂ Fam. FLATTIDAE

✓ ♂ 163 — **Anormenis albula** (Walker, 1851)

Produz estragos insignificantes no cacaueiro. Bahia.

183, 669.

✓ ♂ 163 a — **Poeciloptera phalenoides** (L., 1767).

Em Rezende (Est. do Rio) em *Pithecellobium tortum* (Aristoteles Silva); em Araxá (Minas Geraes) em *Cassia* sp. (J. Hygino Carvalho).

♂ Fam. LATERNARIIDAE

♂ 164 — *Phrictus quinquepartitus* (Distant, 1883)

Produz estragos insignificantes no cacaueiro. Bahia.

165 183, 669.

♂ Superfam. CERCPOOIDEA

♂ Fam. TOMASPIDIDAE

165 — ♂ *Mahanarva indicata* (Dist., 1909)

Ataca as partes epigeas da canna de assucar. Distrito Federal (obs. de Aristoteles Silva) e Estado do Rio de Janeiro.

1009, 1133, 1023, 669.

166 ♂ *Tomaspis furcata* (Germ., 1821)

167 ♂ *Tomaspis indentata* (Walker, 1858)

Ambas observadas, pela primeira vez, por C. Moreira atacando as partes epigeas da canna de assucar. Antonio Azevedo encontrou-a em Nictheroy em capim elephante. Distrito Federal, Estado do Rio e Minas Geraes.

1023, 669, 945, 960.

168 — ♂ *Tomaspis litorata* (Le Peletier et Serville, 1825)
var. *ruforivulata* (Stal, 1854)

Tomaspis parana Moreira nec Distant, 1909

Ataca as partes hypogeas da canna de assucar. S. João Nepomuceno (Minas Geraes), S. Paulo e Guaratiba (Distrito Federal) (obs. Aristoteles Silva).

1009, 1133, 914, 1023, 699, 457 (¹)

169 — *Tomaspis morialis* China & Myers, 1934

(¹) E' pouco conhecido o excellente trabalho do Eng. Agr. Antonio Carlos Pestana sobre estas cigarrinhas, apresentado a 6 de maio de 1920 ao director da Estação Experimental de Campos e publicado, nessa época, num dos jornais dessa cidade.

- 170 — ***Tomaspis picklesi*** China & Myers, 1934
Ambos atacando mory. Baixo Amazonas (China e Myers, 1934).
171 ♂ ***Tomaspis rubra*** (L., 1767)

Ataca as partes epigeas da canna de açúcar. Em Magé (E. do Rio) J. Deslandes encontrou-o sobre *Caprossoba* sp.

1023, 669.

♂ Superfam. *JASSOIDEA*

♂ Fam. AETHALIONIDAE

- ♂ 172 — ***Aethalion reticulatum*** (L., 1767)

Polyphaga. No Distrito Federal e Estado do Rio de Janeiro, ataca: algodoeiro da praia, ameixa de Madagascar, ameixeira do Japão, (obs. de Brandão Filho), aroeira, guando, *Ficus benjamina*, laranjeira, mangueira, resedá (obs. de A. Ferreira Lima); *Sabal palmetto* (obs. de Aristoteles Silva). Na Bahia, Bondar observou este insecto em figueira e em guando. No Rio Grande do Sul, encontra-se-o também em *Acacia melanoxylon* (obs. de O. Soares), em amoreira, corticeira, dahlia, magnolia, jacarandá e platano.

Os ovos são parasitados pelo microhymenoptero *Abbelloides marquesi* Brèthes, 1928 (Trichogrammatidae), segundo material remetido por Azevedo Marques, que também observou a symbiose desta espécie com a formiga *Camponotus crassus* Mayr, 1862.

647, 865, 669, 873, 417, 700, 27, 28, 960, 1263.

♂ Fam. CICADELLIDAE

- ♂ 173 — ***Oncometopia marmorata*** (Fabr., 1803)

♂ *Proconia marmorata* (Fabr., 1803)

- ♂ 174 — ***Rhaphirhinus fasciatus*** (Fabr., 1787)

Rhaphidorhinus fasciatus (Fabr., 1787)

Esta e a espécie precedente atacam fructos e rebentos do cacao-eiro na Bahia.

183, 669.