

VII. R Y N G O T A.

Os rostro: vagina articulata.

150. FVLGORA. *Os rostro inflexo, elongato.*

*Vagina cornea, quinque articulata.**Antennae breves, capitatae.*

1. F. fronte rostrata, recta, alis lividis: posticis ocellatis. *laterna-*
Linn. Syst. Nat. II. 703. 1. ria.

- ✓ 2. *Laternaria phosphorea. Linn. Mus. Lud. Ulv. 152.*
Cucujus peruvianus. Grew. Mus. 158. tab. 13.

*Laternaria. Merian. Sur. tab. 49.**Reaum. Inf. 5. tab. 20. fig. 6. 7.**Roeß. Inf. 2. Gryll. tab. 28. 29.**Seb. Mus. 4. tab. 77. fig. 3. 4.**Habitat in America meridionali.**Prominente fronte, noctu lucem vivacissimam spargit.*

2. F. fronte rostrata, muricata: apice trifido, alis nigris, *Diadema-*
rubro maculatis. Linn. Syst. Nat. II. 703. 2.

*Seb. Mus. 4. tab. 77. fig. 7.**Habitat in India.*

3. F. fronte rostrata, adscendente, elytris viridibus, luteo *candela-*
maculatis, alis flavis, apice nigris. Linn. Syst. Nat. III. 703. 3.

*Laternaria candelaria. Mus. Lud. Ulv. 153.**Ast. Holm. 1746. 63. tab. I. fig. 5. 6.**Edw. Av. tab. 120.**Roeß. Inf. 2. Gryll. 189. tab. 30.**Sultz. Inf. tab. 10. fig. 62.**Habitat in China.*

- phosphorea.* 4. F. fronte rostrata, subulata, adscendente, corpore griseo-glaucō. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 4.
Habitat in America.
- notivida.* 5. F. fronte rostrata, acuminata, adscendente, corpore viridi, alis hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 5.
Habitat in America meridionali.
- lucernaria.* 6. F. fronte rostrata, prominente, corpore supra viride, subitus flavo. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 6.
Habitat in America meridionali.
- flammea.* 7. F. fronte rostrata, adscendente, tereti, truncata. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 7. *Amoen. acad.* 6. 399. 39.
Habitat in America.
- tenebrosa.* 8. F. fronte rostrata, recta, truncata, elytris griseis, scabris.
Habitat in Guinea. *Mus. Banks.*
Magnitudo fere F. laternariae. Caput fuscum, fronte rostrata, recta, tereti, rufa, apice truncata. Thorax et elytra grisea, punctis elevatis fulcis sebra. Alae obscurae.
- obscurata.* 9. F. fronte rostrata, recta, truncata, elytris cinereis, nigro maculatis.
Habitat in nova Hollandia.
Parva. Rostrum longitudine corporis nigrum, basi album, punctis fasciisque duabus albis. Frons rostrata, recta, teres, grisea, apice oblique truncata. Thorax fuscus. Elytra cinerea, maculis nigris plurimis sparsis. Alae albae. Pedes albo nigro-que varii.
- truncata.* 10. F. fronte obtusiuscula, alis truncatis, viridibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 8.
Cicada truncata viridi-albicans, alis deflexis, compressis, postice truncatis. *Linn. Am. Acad.* 6. 399. 40.
Habitat in India.
- Europaea.* 11. F. fronte conica, corpore viridi, alis hyalinis, reticulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 9.
Habitat in Galloprovincia. In Sierra Leon Africæ. *Mus. Banks.*

151. MEM-

151. MEMBRACIS. *Os rostro inflexo.*

Labium corneum, elongatum, apice membranaceum, subulatum.

Antennæ subulatae, fronti insertae.

1. M. foliacea, folio rhombeo, postice latiore.

^o Cicada rhombea. *Linn. Syst. Nat.* II. 704. 1.

Act. angl. 1765. 55. tab. 6.

Habitat in America.

Thoracis folium brunneoscens, maculis duabus obsoletis, subdiaphanis disci.

2. M. thorace foliaceo, rotundato, atro: arcubus albis.

^o Cicada foliata. *Linn. Syst. Nat.* II. 705. 2. *Gronov.*

Zooph. 677.

Merian. Sur. tab. 5. fig. ult.

Habitat in India.

In meo specimine fasciae tres flavae in thorace.

3. M. thorace foliaceo, antice posticeque acuto, griseo.

^o *Linn. Syst. Nat.* II. 705. 4. *gera.*

Habitat in America.

Corpus totum griseum.

4. M. thorace tricorni: postice producto, longitudine ^o*spinoſa,* alarum.

Habitat in Indiis.

Statura M. bicornis, at duplo major. Thorax utrinque spina obtusa et in medio longiori erecta, acuta armatus; postice ad longitudinem alarum productus.

Color testaceus, lineis tribus sanguineis, quae omnes cornu thoracis intermedium percurrent.

5. M. thorace tricorni, cornu intermedio longiori, ^o*acuminata.* compressio.

Habitat in Pennsylvania. *Mus. Banks.*

Caput virescens, immaculatum. Thorax virescens, antice obtusus, cornibus tribus lateralibus brevibus, V v 2 acutis,

acutis, intermedio longiori, erecto, compresso, apice rotundato. Thorax postice porrectus longitudine alarum, striatus. Alae albidae, apice fuscae.

✓ *C. aurita.* 6. M. thorace biaurito, capitis clypeo antrosum dilatato, rotundato.

✓ Cicada aurita. *Linn. Syst. Nat. II. 706. 7.*

Cicada thorace obtuse bicorni. *Geoff. Ins. I. 422. 17.*

Cicada cristata thorace bicorni, corniculis subrotundis. *Schreb. Ins. 8. fig. 1. 2.*

Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 3.

Habitat in quercu, corylo.

○ *punctata.* 7. M. thorace bicorni, albo punctato, postice producto, abdomine longiore.

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Magna in hoc genere. Caput ferrugineum, albo punctatum, clypeo acuto, apice nigro. Thorax punctatus, ferrugineus, albo irroratus, cornubus duobus erectis, compressis, triangularibus, obtusis et fere truncatis, ferrugineis, albo punctatis: angulis nigris. Thorax postice productus, abdomine fere duplo longior, carinatus: carina atra. Alae ferrugineo-fuscae. Pedes fusci, tibiis ferrugineis.

○ *cornuta.* 8. M. thorace bicorni, nigro, postice subulato, longitudine abdominis, alis fuscis.

○ Cicada cornuta. *Linn. Syst. Nat. II. 705. 6. Ins. Sv. 879. Scop. carn. 435.*

✓ Cicada thorace acute bicorni, pone producto. *Geoff. Ins. I. 423. 18.*

Cicada cornuta. *Schreb. Ins. 4. fig. 3. 4.*

✓ Ranatra cornuta. *Petiv. Gazoph. tab. 47. fig. 2. 3. Sutz. Ins. tab. 10. fig. 63.*

Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 2.

Habitat in carduis, salicibus.

○ *Taurus.* 9. M. thorace bicorni, fusco: postice producto, filiformi, longitudine abdominis, cornubus arcuatis.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Statura omnino praecedentis, at paulo minor. Caput fuscum, oculis castaneis puncto que ante oculos albo.

Thorax fuscus, cornubus duobus validis, parum arcua-

arcuatis, postice productus, filiformis. Pectus lateribus niveis. Alae obscurae. Corpus fuscum.

10. M. thorace bicorni, viridi, postice subulato, longitudine abdominis, alis albis. *Vitulus.*

Habitat in America. *Drury.*

Statura omnino M. cornutae. Caput flavescens, oculis fuscis. Thorax bicornis, viridis, atomis albis irroratus cornubusque flavis; postice subulatus, carinatus, acutissimus. Alae albae, margine postico flavescente. Corpus flavescens.

11. M. thorace subinermi, postice producto, abdomine *apunctata.* breviore, testaceo, elytris macula baseos nigra.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*

Parva. Corpus testaceum, macula oblonga nigra ad basin elytrorum.

12. M. thorace bicorni, postice producto; margine albo, *Bonasia.* alis puncto baseos albo.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Minor M. cornuta. Thorax cornubus duobus porrectis, validis, acutis, ater, antice punctis duobus obsoletis, rufis, postice productus, margine albo. Alae fuscae, puncto baseos albo.

13. M. thorace inermi, virescente: postice subulato, longitude abdominis. *inermis.*

Habitat in America.

Statura M. bicornis. Caput deflexum, fulvum, labio acuminato. Thorax omnino inermis, obtusus, virescente, postice productus, carinatus, acutissimus. Alae albae. Abdomen fulvum.

14. M. thorace inermi, fusco: postice producto, abdome dimidio breviore. *Genistae.*

Cicada thorace inermi, pone producto. *Geoff. Ins. 2. 424. 19.*

Habitat in Genista tinctoria Angliae. *Lee.*

M. cornuta triplo minor. Caput deflexum, acuminatum. Thorax inermis, obtusus, fuscus, immaculatus, acutus, postice productus ad dimidiam abdominis longitudinem. Alae albae. Abdomen nigrum, incisuris albicantibus.

○ 152. TETTIGONIA. Os rostro inflexo.

Vagina biarticulata,
gulae inserta.
Antennae setaceae.

- *griffa*. 1. *T. thorace viridi, nigro-sublineato, alis albis: posticis macula baseos flava.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*

Gigas in hoc genere. Rostrum griseo-fuscum, apice nigrum. Frons transverse sulcata. Thorax obscure virens, lineolis aliquot nigris. Scutellum emarginatum. Elytra alba, venis costaque nigris. Margo interior etiam basi niger. Alae posticae albae, macula magna baseos flava. Abdomen fuscum, segmentorum marginibus ciliatis, ano acuminato. Pedes grisei, apice nigri.

- *grisea*. 2. *T. grisea, elytris aqueis: margine postico nigro punctato, costa antice alba.*

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

Corpus totum griseum, vel cinereo fuscoque variegatum. Elytra ottanino aquea, costa basi alba, macula media apiceque fuscis. Ad marginem posticum terminantur nervi puncto fuso, unde margo punctis sex fuscis notatus. Femora antica annulo fuso. Tibiae basi apiceque fuscae.

- *limbata*. 3. *T. thoracis margine dilatato, acuto, alis atris: margine albo.*

Habitat in America. *Mus. Banks.*

Magna. Caput virens, fronte sulcata. Thorax rotundatus, viridis, margine dilatato, acuto. Scutellum obtusum. Abdomen supra fuscum. Elytra virens, apice hyalina, maculis fuscis, albae innatis. Alae atrae, margine postico albo.

- *dilatata*. 4. *T. thoracis margine dilatato, atra, alis albidis.*

Habitat in Iamaica. *Mus. Banks.*

Præcedente minor. Corpus totum atrum, immaculatum. Thoracis margo dilatatus. Elytra cinerea, costa maculisque paucis fuscis. Alae albidae.

5. *T.*

5. *T. scutello emarginato, alarum costa virescente.*

Cicada Tibicen elytris anastomosis ferrugineis, scutelli apice emarginato. *Linn. Syst. Nat. II. 707. 19. Mus. Lud. Ulv. 160.*

- *Tibicen*. *Merian. Sur. tab. 49.*

✓ *Panopha. Browne. Iam. 436, tab. 43, fig. 15.*

✓ *Guereua Erementi. Margr. bras. 256.*

Habitat in America.

Variat thorace nigro et nigro brunneoque variegato.

6. *T. nigra, elytris albis: costa flava.*

○ Cicada septendecim nigro-virescente, elytris margine flavescente, capite utrinque octo-striato. *Linn. Syst. Nat. II. 708. 20.*

Cicada maxilla utraque lineis octo transversis, concavis, alarum margine inferiore lutescente. *Kalm. Act. Holm. 1756. 101.*

Collinf. Act. Angl. 1765. 65. tab. 8.

Habitat in America.

Corpus nigrum. Lamellæ abdominis breves ovatae.

7. *T. thorace variegato, elytris hyalinis: antice nervis punctatis, postice strigis duabus undatis, fuscis.*

Habitat in Capite B. Sp. *Mus. Banks.*

Caput atrum, puncto utrinque oculari et unico verticale flavis. Thorax ater, lineis quinque obliquis margineque postico flavis. Scutellum magnum atrum, postice punctis duobus margineque flavis. Abdomen album, maculis dorsalibus atris. Elytra hyalina, nervis testaceis, ultra medium nigro punctatis; postice strigae duae valde undulatae, fuscae. Alae concolores, at nervis immaculatis. Pedes nigri, femoribus anticis utrinque linea rubra.

8. *T. villosa, elytris griseis, alis flavis: omnibus margine hyalino.*

○ Cicada stridula elytris margine dilatato, punctis septem albis. *Linn. Syst. Nat. II. 706. 12. Mus. Lud. Ulv. 157.*

- Cicada catenata. *Drury Ins. 2. tab. 37. fig. 2.*

Habitat in Capite B. Sp.

Tibicen.

septende-
cim.

Catena.

stridula.

Cor-

Corpus totum villosum, obscurum. Thorax et scutellum virescentia, nigro-variegata. Elytra grisea, margine postice hyalino, et ante marginem maculae septem oblongae, hyalinæ, annulo fuscæ cinetæ. Alæ flavæ, postice fuscæntes, maculis obsoletis marginæque hyalino.

- Cingulata.* 9. T. thorace maculato, elytris hyalinis: costa maculaque fuscis, abdomine atro: fasciis flavis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

Caput et thorax variegata. Thoracis margo emarginatus. Scutellum magnum nigrum, lineis duabus dorsalibus flavescens. Margo flavescens, puncto magno nigro. Abdomen atrum, supra segmentorum marginibus flavis, in medio interruptis, subtus lineis quatuor punctorum flavorum. Anus acuminatus, ater. Laminae abdominis pallidae. Pedes flavo nigroque variegati.

- Cruentata.* 10. T. thorace variegato, elytris hyalinis: costa flavescente, abdomine atro: fasciis sanguineis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

Parva. Caput flavescens, puncto frontali nigro. Vertex niger, puncto baseos flavo. Thorax ferrugineus, linea dorsali flava, lineis quatuor obliquis punctisque duobus baseos nigris. Abdomen supra atrum, segmentorum marginibus sanguineis, segmento primo et secundo immaculatis; subtus sanguineum, tenuento argenteo splendens. Elytra hyalina, immaculata, costa sola basi flava, apice sanguinea. Lamellæ abdominis ovatae, flavæ.

- haemato-*
des. 11. T. nigra, immaculata, abdominis incisuris sanguineis.

Cicada haematodes. *Linn. Syst. Nat. II. 707. 14.*

Scop. carn. 347.

Periv. Gazoph. tab. 15. fig. 7.

Granov. Zooph. 675.

Habitat in Europa australi.

- Orni.* 12. T. nigra flavo maculata, alis albis: basi flavis; maculis duabus nigris.

Cicada Orni elytris intra marginem punctis sex concatenatis anastomosibusque interioribus fuscis. *Linn. Syst. Nat. II. 707. 16.* *Scop. carn. 346.*

Roes.

Roes. Inf. 2. Gryll. tab. 25.

Reaum. Inf. 5. tab. 5. fig. 16. 17. 18. 19.

Sulz. Inf. tab. 10. fig. 65.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 14.

Habitat in Europa australi.

Caput nigrum, maculis tribus flavis inter oculos.

Vertex stemmatibus tribus rufis. Thorax niger, fascia media maculisque aliquot anticis flavis. Scutellum utrinque retusum, apice emarginatum, flavidum; linea media nigra. Abdomen nigrum, subtus flavidum. Alæ albae, basi flavae, macula dupli nigra.

13. T. grisea, thoracis linea alba, clytris albo-reticulatis. *reticulata.* [○]

Cicada reticulata. *Linn. Syst. Nat. II. 707. 18.*

Habitat in America meridionali.

14. T. atra, alis albis, basi nigris; venis testaceis. *atrata.* [○]

Habitat in China. *Gannerus.*

Magnitudo praecedentium: tota atra, abdominis margine, in primis ultimi segmenti, testaceo. Alæ omnes albidae, basi nigrae, venis testaceis.

15. T. nigra, ore, thoracis maculis duabus abdomine- *sanguino-*
que sanguineis. *lenta.* [○]

Habitat in China. *Drury.*

Caput nigrum, ore rufo, linea longitudinali rostroque nigris. Thorax glaber, niger, macula utrinque orbiculata, rufa. Abdomen rubrum. Alæ omnes obscure fuscae, immaculatae. Pedes nigri.

16. T. elytris fuscæ-aureis, tibiis anticis incrassato- *splendida-*
dentatis, rufis. *la.* [○]

Habitat in China. *Drury.*

Parva. Caput nigrum, oculis pallidis. Thorax pallidus, maculis duabus magnis, orbiculatis, nigris. Scutellum nigrum, margine pallido. Abdomen rubrum. Elytra fusca, colore aureo vivacissimo splendentia. Pedes antici femoribus nigris, tibiis crassissimis, dentatis, rufis. Pedes postici nigri, femoribus rufis.

17. T. elytris hyalinis: costa sanguinea, abdomine linea *muta.* [○]
dorsali sanguinea.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

V v 5

Parva.

Parva. Corpus pallide mox virescens, mox rufescens. Antennae nigrae. Thorax linea dorsali flavescens. Scutellum postice punctis duobus nigris impressis. Abdomen linea dorsali argentea. Elytra hyalina, costa marginisque tenuioris basi sanguineis. Alae hyalinae. Lamellae abdominis brevissimae, spina acuta baseos.

○ *violacea*. 18. T. *violacea*, alis apice fusca.

○ Cicada *violacea*. Linn. Syst. Nat. II. 708. 21. Mus. Lud. Ulr. 162.

Habitat in terris australioribus.

Minor, corpus violaceum. Elytra basi ferruginea, apice fusca. Alae pallidae, apice fuscae.

153. CICADA. *Os rostro inflexo.*

Labium rotundatum, apice fetaceum.

Antennae sub oculis insertae.

○ *ocellata*. 1. C. elytris compressis, adscendentibus, viridibus: punctis ocellaribus ferrugineis.

Habitat Tranquebariae. Koenig.

Major, viridis. Elytra valde compressa postice in angulum acutum adscendentib; viridia, punctis ocellaribus numerosis sparsis. Pedes pallidi.

○ *marginalia*. 2. C. flava, elytris deflexis, nigris: linea laterali albata.

Linn. Syst. Nat. II. 710. 59.

Habitat in America.

Alae pallidae.

○ *Phalaenoides*. 3. C. exalbida, alis deflexis, patulis: elytris antice fuscodes.

Linn. Syst. Nat. II. 710. 40.

Habitat in America.

Alae niveae.

○ *bipunctata*. 4. C. exalbida, clytris deflexis, thoracis margine antico punctis duobus impressis.

Linn. Syst. Nat. II. 710. 41.

Habitat in America.

5. C.

5. C. grisea, elytris deflexis, capite apice puncto nigro. Habitat in America. v. Rohr.

Statura omnino C. bipunctatae, at color totus griseus s. cinereo fusoque mixtus. Caput apice terminatur puncto nigro. Puncta duo capite et duo alia thoracis margine antico impressa.

6. C. viridis, elytris deflexis, alis albis, fronte conica. Habitat in America. v. Rohr. In nova Hollandia. Banks. Statura praecedentis, at tota viridis, alis solis albis.

7. C. elytris deflexis, viridibus: dorso scabro, capite, margine postico thoraceque linea dorsali sanguineis. Habitat in nova Hollandia. Mus. Banks.

Parva. Caput pallidum, fronte carinata marginaque postico elevato, sanguineo. Thorax viridis, linea dorsali sanguinea, quae tamen marginem anticum haud attingit. Elytra viridia, punctis elevatis nigris, imprimis dorsalibus, scabra. Margo tenuissime sanguineus. Pedes pallidi, tibiis anticis sanguineis.

8. C. alis deflexis, hyalinis: striga, fascia punctisque fusca, ano lanato. Linn. Syst. Nat. II. 711. 44.

Habitat in India.

Frons ovata, ferruginea.

9. C. alis nigris: punctis coeruleis, fronte lateribusque rubris, ano lanato. Linn. Syst. Nat. II. 711. 42. Mus. Lud. Ulr. 163.

○ Cicada lanata. Drury Inf. 2. tab. 37. fig. 3.

Habitat in India.

Elytra apice fusca. Oculi spinosi.

10. C. elytris deflexis, viridibus, fulvo-subfasciatis, alis tomentosa, albis: fasciis duabus atris.

Habitat in India orientali. Mus. Tortianum. Caput viride, fronte plana, laevi rostroque fuso. Antennae fuscae, setigerae, sub oculis insertae. Thorax fuscus. Elytra viridia, fasciis duabus interrupitis, ferruginea, apice grisea, punctis aliquot atris. Alae niveae, fasciis duabus posticis atris, anteriore ad marginem tenuiore dilutiore. Abdomen fuscum, ano lana densissima, nivea. Pedes ferruginei, tibiis anticis compresso-membranaceis, posticis dentatis, nigris.

ii. C.

- barbata.* 11. *C. fusca*, abdomine virescente: ano lanato, niveo. Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*
Magna. Caput fuscum, fronte plana, laevi. Thorax fuscus, scutello acuto. Abdomen virescens, ano lana multa nivea techo. Elytra fusca, punctis aliquot nigris in medio et albis obsoletis ad apicem. Alae fuscae, nitidae. Pedes nigri, femoribus quatuor anticis basi sanguineis.
- villosa.* 12. *C. viridis*, elytris deflexis, exalbidis, ano lanato. Habitat in America. *v. Robr.*
Parva: statura omnino Chermes. Anus lana densa alba obvolutus.
- vittata.* 13. *C. flava*: vitta ferruginea, longitudinali, dupli repando-dentata. *Linn. Syst. Nat. II. 710. 36.* *Fn. Sv. 889.*
Habitat in Europa.
- lateralis.* 14. *C. nigra*, elytris latere albis. *Linn. Syst. Nat. II. 709.*
29. *Fn. Sv. 885.* *Geoff. Inf. I. 416. 3.*
Locusta pulex fusca, utrinque in lateribus alarum arcu albidente. *Raj. Inf. 68. 2.*
Habitat in Europae plantis.
- variegata.* 15. *C. supra nigra*, scutello, elytris maculis duabus dorsibus margineque exteriori flavescentibus.
Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*
Statura praecedentium. Antennae sub oculis insertae. Caput nigrum, subtus flavum, immaculatum. Thorax niger, linea dorsali postica flava. Elytra nigra, rubro-substriata, puncto parvo flavo ad apicem scutelli, in medio dorsi macula oblonga flava, communis. Margo exterior hyalinus, in medio interruptus. Subtus tota flavescentis.
- feneffrata.* 16. *C. supra nigra*, capite scutelloque flavis, elytrorum margine hyalino.
Habitat in insula Otaheiti oceanii pacifici. *Mus. Banks.*
Parva, supra fusca, capite flavo, margine postico tenuissime fusco. Thorax fuscus, immaculatus, scutello flavo. Elytra fusca, margine exteriori hyalino, in medio interrupto. Subtus tota flava.

17. C.

17. *C. nigra*, oculis albis. *Linn. Syst. Nat. II. 709. 26.* *leucophthalma.*
Fn. Sv. 883.
Habitat in Europa boreali.
18. *C. nigra*, capite thoracisque basi flavescentibus. *Linn. Syst. Nat. II. 709. 28.* *lencocephala.*
Geoff. Inf. I. 421. 15.
Habitat in Europa boreali.
19. *C. clytris flavis*: linea nigra dupli interrupta longitudinali. *Linn. Syst. Nat. II. 710. 35.* *Fn. Sv. 889.* *interrupta.*
Geoff. Inf. I. 419. 9.
Ranatra bicolor ex fusco et pallido striata. *Petiz. Gaz. Zuph. Gr. fig. 10.*
Habitat in Europa.
20. *C. nigra*, capitis margine postico thoraceque flavis. *flavicollis.*
Cicada flavicollis fusca, capite thoraceque flavis. *Linn.*
Syst. Nat. II. 709. 33. *Fn. Sv. 891.*
Habitat in Europae graminolis.
Caput atrum, nitidum: margine postico flavo; punctis duobus minutissimis nigris. Thorax flavus, immaculatus. Scutellum et basis elytrorum flavescentia. Elytra nigra. Alae albae, nervis nigris. Corpus et pedes nigra.
21. *C. elytris viridibus*, capite flavo; punctis nigris. *Linn. viridis.*
Syst. Nat. II. 711. 46. *Fn. Sv. 896.* *Geoff. Inf. I. 417. 5.*
Locusta pulex paulo minor. *Raj. Inf. 68. 3.*
Ranatra viridefens. *Petiz. Gaz. Zuph. 73. tab. 76. fig. 6.*
Habitat in Europae plantis.
22. *C. viridis*, capite thoraceque carneis. *Linn. Syst. Nat. Lanio.*
II. 710. 37.
Habitat in Europa.
23. *C. atra*, abdomine flavo, alis apice fuscis: lunula hyalina. *Turca.*
Habitat in Brasilia. *Mus. Banks.*
Gigas in hoc genere. Caput atrum, antennis crassis, ferrugineis. Thorax ater, scutello carinato, acuto. Abdomen flavescentis, supra basi atra. Elytra coriacea, nervosa, atra, apice fusca, punctis aliquot minutissimis albis. Alae atrae, basi maculis tribus sanguineis, apice fuscae, lunula magna hyalina. Pedes nigri, femoribus posticis flavis.
24. C.

- Maura.* 24. *C. nigra*, pectore abdomineque sanguineis.
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*
Media. Caput atrum, fronte plana, laevi. Thorax
ater, scutello acuto. Pectus et abdomen sanguinea.
Elytra et alae atra, immaculata. Pedes atri, femori-
bus posticis sanguineis.
- pellucida.* 25. *C. grisea*, clytris fascia media hyalina.
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Banks.*
Caput griseum, apice dilatatum, rotundatum, fronte
plana, laevi. Thorax griseus, lineis duabus dor-
salibus nigris. Scutellum acutum. Elytra grisea,
fascia in medio lata, hyalina. Alae fuscae. Abdo-
minis latera subtus dilatata, deflexa, fornicate.
- Cynosha.* 26. *C. fusca*, alis albis: margine fusco punctato.
Habitat in Daniae rosis.
Maior *C. Rosae*. Caput fuscum, pedibus flavescentibus.
Alae magnae, albac, margine fusco punctato.
- Serratu-*
iae. 27. *C. flava*, clytris albis: puncto fasciisque duabus
nigris.
Habitat in Angliae carduis. *Mus. Banks.*
Parva. Caput flavum, puncto verticali nigro. Scu-
tellum margine nigro. Elytra albida, puncto ba-
seos fasciisque duabus apicis nigris.
- nervosa.* 28. *C. alis fuscis*: nervis albo nigroque punctatis.
Cicada nervosa fusca, alis hyalinis, fusco maculatis:
nervis punctatis. *Linn. Syst. Nat. II. 709. 25. Fn.*
Scop. carn. 341.
Habitat in Europa.
Variat clytris fascia media fusca. *de Hattorf.*
- variegata.* 29. *C. atra*, viridi-variegata, alis hyalinis: punctis tri-
bus costalibus nigris.
Habitat in Germania. *de Hattorf.*
Statura praecedentis. Caput et thorax fusco viridique
variegata. Abdomen atrum. Alae hyalinae, ner-
vose, nervis punctis aliquot albis et ad costam pun-
cta tria, parva, distincta, nigra.

30. C.

30. *C. fronte thoraceque glaucis: punctis quatuor ocel-
laribus nigris, clytris hyalinis: margine flavescente.*
lyncea.
Habitat in India orientali. *Koenig.*
Parva. Os flavescentis, signaturis nigris. Frons glauca,
utrinque puncto atro, annulo flavescente cincto.
Lineola in medio frontis. Thorax itidem glaucus,
antice punctis duobus ocellaribus, atris. Alae hya-
line, margine exteriori flavescente.
31. *C. flava*, clytris fusco-auratis.
fulgida.
Habitat in Anglia. *Mus. Banks.*
Parva, flava. Thorax fuscus: clytra fusco-aurata,
margine flavescente. Macula communis dorsalis al-
bida in medio.
32. *C. clytris flavescentibus, fusco punctatis.*
punctata.
Cicada fusco-pallida, clytris membranaceis, virescen-
tibus, scutello macula dupli triangulari. *Geoff. Inf. I.*
417. 4.
Habitat in Europae nemoribus.
Parva, flavescens. Puncta duo nigra ad basin thoracis,
duo alia in scutello. Elytra exalbida, punctis ali-
quot nigris sparsis. Abdomen nigrum.
33. *C. flava*, alis albis, apice fusco striatis. *Linn. Syst.* *Rosae.*
Nat. II. 712. 50. Fn. Sv. 902. Geoff. Inf. 21. 428. 28.
Reaum. Inf. 5. tab. 20. fig. 10 — 14.
Frisch. Inf. II. 13. tab. 20.
Habitat in rosae foliis.
34. *C. flava*, clytris fulvo pictis: maculis quatuor nigris *aurata.*
posticeque auratis. *Linn. Syst. Nat. II. 711. 48. Fn.*
Sv. 899.
Habitat in Europa boreali, Suecia.
35. *C. grisea*, capite depresso, plano: apice fusco. *cuspidata.*
Habitat Bristol in Anglia. *Mus. Banks.*
Parva: tota grisea. Caput magnum cuspidatum, apice
fuscum.

154. CER.