

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Document-ID:42059375

Patron :

Note :

NOTICE:

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Pages :5                      Printed: 04-23-08 13:28:56

Sender: Univ of Connecticut (UCW)



ILL: 42059375

Call Level A

Number:

Location:

Maxcost: \$40.00IFM

DateReq: 4/18/2008

Date Rec: 4/21/2008

Borrower: DLM

Yes

No

Conditional

Request Type:

Source: FSILLSTF

LenderString: \*UCW,RBN,IWA,MYG,EYM

OCLC Number: 6303212

Affiliation:

Staff Email: ILL@hawkins.lib.udel.edu

Billing Notes:

Title: Svenska Vetenskapsakademien, Stockholm. Ofversight af forhandlingar

Uniform

Title:

Author:

Edition:

Imprint: Stockholm : P.A. Norstedt & Söner 1844 1902

Article: Stal. C. "Nya svenska Homoptera "

Vol: 10

No.:

Pages: 174-177

Date: 1853

Dissertation:

Verified: Metcalf 1944 Bibliography of the Homoptera Needby: WorldCat Type: SerialWorldCat Desc: 59 v. ; Type: Serial

Borrowing ClioID: 2054007/////

Notes:

ShipTo: ILL/University of Delaware Library/181 So. College Avenue/Newark, DE 19717-5267

E-delivery

Addr: (302) 831-2481

Ship Via: ARIEL (128.175.82.31)/FAX (302/831-2481)1ST CLASS

ram lineolaque laciniae anterioris longitudinali nigro-fuscis; digiti tertii ciliis breviusculis.

*Pteroph. mictodactylus* ZELLER. Lin. Ent. VI, 358.

Hab. ad Trolle Ljungby initio Junii rarius. In prato nunc exarato specimina nonnulla anno præterlapso collegi.

**6. Nya svenska Homoptera.** — Hr BOHEMAN inlemnade en af Studenten CARL STÅL under förestående titel författad uppsats:

»Oaktadt de många bidrag, som i sednare tider blifvit lemnade till kännedomen af de svenska Hemipterarterna, påträffas dock understundom ännu nya, serdeles bland Homoptera. Då i år några nya arter af sistnämnde grupp blifvit upptäckta, och ett par förut finnas i Riks-Musei och min samling, får jag här på dessa lemna beskrifningar:

1. *DELPHAX smaragdula*: elliptica, pallide virescens; vertice producto, antennis pedibusque dilute flavescentibus; hemelytris abdomine vix dimidio brevioribus, apice late rotundatis, albidis. ♀. Long. 5, Lat.  $1\frac{3}{4}$  Millim.

Ad Experimentalfältet prope Holmiam specimina sex a Dom. BOHEMAN capta.

Feminae *Delph. truncatipennis* statura similis. Pallide virescens. Caput thorace angustius, antice productum, angustatum, postice sinuatum, basi bifoveolatum, supra utrinque carinatum, carinis antice convergentibus; fronte reclinato-declivi, plana, tricarinata; oculis sat magnis, irregulariter reniformibus, fuscis, postice glaucescentibus. Antennae capitis longitudine, pallide flavescentes, seta fuscescente. Thorax antice productus, angustatus, lateribus obliquis, paullo rotundatis, postice sinuatus, supra convexiusculus, longitudinaliter tricarinatus, basi biimpressus. Scutellum magnum, late triangulare, convexiusculum, dorso longitudinaliter tri-carinatum, lateribus leviter sinuatum, apice acutum. Hemelytra oblongo-quadrata, ante medium abdominis abbreviata, apice extus lata, intus magis rotundata, albida, nervis distinctis, elevatis, margine toto dilute lutescente. Abdomen supra segmento singulo apice dilute flavomarginato; pectus late virescens. Pedes pallide flavescentes; tibiis posticis dilute virescentibus; unguiculis infuscatis.

2. *DELPHAX sordidula*: pallide flavescens; capite, thorace scutelloque albido-tricarinatis; fronte utrinque infra oculos puncto nigro; vertice thoraceque bifoveolatis; hemelytris abdomine multo brevioribus, albidis, margine dilute flavescente, apice rotundatis; pectore plus minus nigro-vario; abdomine in mare nigricante,

linea dorsali margineque flavescentibus, in femina plus minus nigrovario. ♂ Long.  $3\frac{1}{2}$ , Lat.  $1\frac{1}{4}$ , ♀ Long. 4, Lat.  $1\frac{1}{2}$  Millim.

In Uplandia ad Upsalam loco arido minus frequenter legi; prope Holmiam ad Bellevue a Dom. BOHEMAN etiam capta.

*Delph. collinae* simillima, at major. Caput antice productum, sub-obtusum, pallide testaceum; vertice basi foveolis duobus, transversim positis, antice carinis quatuor, mediis approximatis; fronte rostrique basi tricarinatis, hac utrimque infra oculos puncto nigro; oculis fusco-cinereis. Antennae extus sensim incrassatae, testaceae, seta dilute fuscescente. Thorax brevis, antice productus, rotundatus, pallide testaceus, albido-tricarinatus, carinis laterilibus obliquis, obsoletioribus, media recta evidentiore, utrimque foveolatus. Scutellum late triangulare, tricarinatum, apice attenuatum, medio albidescens. Hemelytra ovalia, abdomine breviora, albido-hyalina, pallide flavomarginata. Pectus nigrovarium. Abdomen maris nigricans, linea dorsali margineque flavescentibus, feminae plus minus nigrovario. Pedes pallide testacei; tarsis apice infuscatis.

Variat femina fere tota dilute flavescens.

3. *DELPHAX collaris*: nigrofusca, subnitida; capite albido-quadricarinato; thorace postice albido, hemelytris abdomine dimidio fere longioribus, apice rotundatis, sordide albido-hyalinis, fusconervosis; pedibus pallide testaceis, dilute fuscovariis. ♂♀ Long. 4, Lat. 1 Millim.

In Gottlandia, Dom. BOHEMAN et ipse. In Uplandia etiam, rarius tamen, a me lecta.

Colore corporis *Delph. moesta* similis. Caput testaceum, albido-quadricarinatum, rostro basi tricarinato, oculis fusco-grisescens. Antennae testaceae, seta dilute fuscescente. Thorax brevissimus, antice productus, subrotundatus, tricarinatus, postice late albomarginatus. Scutellum magnum, nigrofuscum, subnitidum, subtiliter confertim punctulatum, lateribus anguste apiceque sordide albidis, medio leviter carinatum. Hemelytra abdomine dimidio longiora, sordide albido-hyalina, nervis margineque imo dilute fuscescentibus. Abdomen nigricans, subtus margine obsolete sordide flavovario. Pedes pallide testacei, dilute fuscovariati; tarsis apice fuscis.

4. *ATHYSANUS obtusifrons*: oblongus, fuscus (♂), vel pallidus (♀); capite obtuse triangulari, antice inter oculos nigro; thorace antice scutelloque flavescentibus, vittis duabus fuscis; hemelytris flavonervosis, interstitiis fusco-ocellatis (♂), vel pallidioribus (♀). ♂ Long. 5, Lat.  $2\frac{1}{4}$ . ♀ Long. 6, Lat.  $2\frac{1}{2}$  Millim.

In Scania ad Landseronam individua plura d. 4 Aug. a me lecta.

Sat magnus, *Athysano grisescenti*, *transverso* et *plebejo* certe affinis, ab omnibus tamen capite magis obtuso, ut et colore certe distinctus. Caput breve, latum, apice obtuse triangulare, griseo-flavescens; vertice apice linea transversa arcuata nigra; fronte in mare nigrobrunneo, medio transversim subtiliter luteolineato,

in femina dilutiore; oculis ovatis, fuscis. Antennæ testaceæ, seta fusca. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, postice late leviterque sinuatus, antice flavescens, utrimque striga parva transversa nigra, postice fuscescens, vittis quatuor longitudinalibus obscurioribus. Scutellum magnum, triangulare, vittis tribus fuscis. Hemelytra deflexa, apice rotundata, in mare abdomine longiora, pallido-nervosa, interstitiis fuscis, medio dilutioribus, apice fumata; in femina abdominis longitudine, similiter picta ac in mare, at dilutiora et absque fusciscentia apicis. Corpus maris subtus nigrofuscum, femine fuscovariegatum. Pedes testacei, parce fuscovarîi; tarsis fusco-annulatis.

5. *TYPHLOCYBA pictilis*: albida, nitida; capite triangulariter producto, vertice, prothoraceque lateribus anguste nigromarginatis; hemelytris basin versus vitta obsolete fusciscente, medio margine lineâ obliqua fusca, apice fuscolineatis, et maculatis; abdomine flavescente, supra nigrovario; tibiis posticis tarsisque omnibus apice fusciscentibus. ♀. Long. 4, Lat.  $1\frac{1}{4}$  Millim.

Specimen unicum d. 24 Juli a Dom. BOHEMAN loco umbroso ad Experimentalfältet prope Holmiam lectum.

Species elegantissima et distinctissima. Caput antice triangulariter productum, apice subobtusum, albidum, antice anguste nigromarginatum; oculis fusco-glauciscentibus. Antennæ capite cum thorace nonnihil longiores, albidae, seta extrorsum dilute fusciscente. Thorax latitudine vix dimidio brevior, antice productus, rotundatus, postice levissime sinuatus, convexiusculus, albidus, lateribus anguste nigromarginatus. Scutellum magnum, late triangulare, sordide albidum, basi lineis quatuor sat latis, longitudinalibus, dilute fuscis. Hemelytra corpore dimidio longiora, albedo-hyalina, certo situ dilute fusco-aurescentia, vitta obliqua basali, ante medium abbreviata margineque interiore basin versus dilute fusciscentibus; medio lineâ obliquâ, curvata, apice lineis quinque obliquis maculis duobus, quarum una in margine interiore longe pone medium, altera apicali, fuscis. Abdomen dilute flavescens, supra fuscovarium. Pedes albi; tibiis posticis imo apice tarsisque omnibus art. ultimo fuscis.

6. *TYPHLOCYBA placidula*: dilute flavescens; capite triangulariter producto, supra macula irregulari nigropurpurea; thorace medio vitta lata sordide purpurascens; hemelytris vitta suturali mox pone medium abbreviata, dilute rubescente; abdomine supra nigricante. ♀. Long. 3, Lat.  $\frac{3}{4}$  Millim.

In Scania Dom. BOHEMAN.

Caput antice triangulariter productum, subobtusum, flavescens, supra basi macula subquadrata cum alia minore apicali, fere cruciata, confluenta, nigropurpureis. Antennæ flavescentes, seta dilute fusca. Thorax latitudine vix dimidio brevior, convexiusculus, dilute flavescens, antice productus, leviter rotundatus, postice truncatus, medio vitta lata, sordide purpurascens. Scutellum triangulare, nigropurpurascens. Hemelytra albida, hyalina,

basin

basin versus flavescens, vitta sat lata suturali, mox pone medium desinentes, dilute rubescente. Corpus subtus dilute flavum, abdomen supra nigricans, limbo latius, segmentorumque apicibus anguste flavescens. Pedes dilute flavescens.

7. *TYPHLOCYBA Wallengreni*: pallide flava; capite antice subrotundato-producto; thorace latera versus dilute fuscenscente; hemelytris ad basin macula oblonga, obliqua, medio margine macula irregulariter quadrata, fasciaque lata intra apicem dilute fuscenscentibus. Long.  $2\frac{1}{2}$ , Lat.  $\frac{3}{4}$  Millim.

In Scania. Dom. WALLENGREN.

Caput antice late triangulariter productum, lateribus leviter rotundatum, dilute flavum, oculis brunnescentibus. Antennæ flavescens, seta obscuriore. Thorax latitudine dimidio brevior, dilute flavescens, latera versus vitta latiore dilute fuscenscente. Scutellum triangulare, basi dilute fuscenscentibus. Hemelytra alba, hyalina, nervis sat validis, pone basin vitta obliqua abbreviata, pone medium macula laterali irregulari, apice macula majore transversa, alias nonnullas minores albas includente, fuscenscentibus. Corpus dilute flavum. Pedes flavescens, tarsi apice obsolete fuscis.

7. *Bref från resande naturforskare.* — Hr WAHLBERG meddelade följande utdrag ur tvenne bref från Hr Mag. N. J. ANDERSSON, det ena dat. Capstaden den 9 April, det andra Plymouth den 9 Juni detta år.

»Medan vi befunno oss i China (den 9—28 Decemb.) herrskade der den för blommorna ogynnsamma vintern. Väl märktes detta föga på skogarne och lunderna, som ännu bibehöllo sin täta gröna drägt, fastän höstens rödt och gult skimrade fram mellan löfhvalfven här och der. Men så mycket ögonskenligare blefvo årstidens härjningar då botanisten på marken sökte spåren af den Flora, som smyckar dessa trakter under skönare och gynnsammare årstider. Der stodo nu blott några höstligt afbitna, halft förvissnade kvarlevor, endast ormbunkarne, gräsen och några cosmopolitiska Compositæ höllo sig manhaftigt, och *Ixora* lyste röd på Chinesernas grafvar. Kring