

3. *Nya Hemiptera.* — Herr C. STÅL hade insändt följande fortsättning af sina beskrifningar öfver nya arter af denna klass.

SCUTELLEROIDES. (DALL.)

CALLIDEA. (LEP.)

1. *C. coelestis*: obscure virescente-chalybeus; thorace maculis 11, quarum 3 antierius, 4 posterius, 2 que medio utrimque, nigris; scutello profundius et densius punctato, ruga elevata transversa antica, impunctata, maculis 8, quarum una media triangulari, 3 utrimque unaque apice positis; pectore obscuriore, disco flavo; abdomine flavo, segmento singulo utrimque macula transversa chalybeo-violacescente, segmento ultimo nigroviolaceo; femoribus miniatis, apice tibiisque chalybeis, antennis tarsisque nigris. Long. 19, lat. 9 millim. — Madras Indiæ orientalis.

PACHYCORIS. (BURM.)

1. *P. scurrilis*: ferrugineo-brunneus; capite flavo, vitta media nigra; thorace marginibus antico et lateralibus, maculis 14, (5, 5, 4) angulisque posticis flavis; scutello maculis 6 basalibus, 4 vel 5 mediis, quarum intermediis confluentibus, fasciaque prope apicem, cum maculis mediis per lineam longitudinalem et cum macula apicis flava immediate, cohærente, flavis; subtus nigricans; flavomaculata, maculis abdominis utrimque serie tripplo positis; pedibus flavis, tibiis extus fuscis; antennis nigris, art. basali luteo. Long. 9, lat. 5 millim. — Mexico.

BRACHYPLATYS. (BOISD.)

1. *B. cingalensis*: nigro-æneus; capitis lobo medio maculis 2, lobis lateralibus singulo linea transversa aliaque parva longitudinali flavis; thorace utrimque flavomarginato, antice et utrimque linea contigua intramarginali flava; scutello flavomarginato; macula costali basali hemelytrorum, margine abdominis maculaque intramarginali longitudinali segmenti singuli flavis; pedibus rufotestaceis; antennis fuscis, art. basali testaceo. Long. 8, lat. 7 millim. — Ins. Taprobana.

COPTOSOMA. (LAP.)

1. *C. nigropunctatum*: supra cum pedibus flavum, vage subrude nigropunctatum; capitis lobo medio maculisque 2 basalibus nigris; thorace antice impunctato, linea utrimque antico-laterali fasciaque antica intramarginalibus, nigris; scutello ruga antica impunctata; subtus nigricans; abdomine margine superiore flavo; segmento singulo utrimque transversim biserialim flavopunctato, margineque laterali flavo. Long. 3½, lat. 2½ millim. — Sierra Leona.

SCIOCORIDÆ. (DALL.)

PARAMECOCORIS (STÅL.)

1. *P. binotatus*: fuscotestaceus, nigropunctatus; capite ovato, marginibus basin versus parum reflexis, apice emarginato; scutello medio

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh., d. 18 April 1855.

longitudinaliter sublaevi; hemelytris macula parva pone medium flava; membrana flavotestacea, nervis fuscopunctatis; subtus minus dense punctatus, abdomine utrimque nigricante, segmentis basi apiceque fuscoferrugineo-marginatis, ultimo toto pedibusque fuscoferrugineis; antennis obscure rufotestaceis, apicem versus fuscis. Long. 13, lat. 7 millim. — Sierra Leona.

2. *P. gastricus* (THBG): flavotestaceus, dense subprofunde nigrofuscopunctatus; capite lateribus parallelis, a medio obliquis; scutello basi utrimque callo flavotestaceo, impunctato; membrana fuscescente; subtus cum pedibus dilutior, minus dense punctatus, abdomine utrimque vitta nigricante; antennis rufescentibus, art. 2 ultimis fuscis, basi sordide flavis. Long. 9, lat. 5 millim. — India orientalis.

#### AEDNUS. (DALL.)

1. *A. circumflexus*: niger, punctatissimus; marginibus lateralibus thoracis, costali hemelytrorum, abdominisque toto flavis; pedibus antennisque flavotestaceis, his nonnihil obscurioribus. Long. 7, lat. 5 millim. — Patria ignota.

#### HALYDIDÆ. (DALL.)

##### MACROPYGIUM. (SPIN.)

1. *M. flavopustulatum*: supra rufoferrugineum, parce punctatum, maculis flavis, impunctatis dense ornatum; subtus flavescens; antennis flavis, (art. ultimi desunt.) Long. 13, lat. 8 millim. — Patria ignota.

#### ANTITEUCHUS. (DALL.)

1. *A. luctuosus*: fuscobrunneus, nitidus, punctatus, supra callis deplanatis, parvis, flavis dense sparsus; antennis nigrofuscis, abdomine pedibusque flavotestaceis, illo lateribus obscuriore, his pilosis, præsertim femoribus brunneopunctatis. Long. 11, lat. 7 millim. — Patria ignota.

#### PENTATOMIDÆ. (DALL.)

##### PENTATOMA. (P. BEAUV.)

1. *P. principalis*: supra obscure viridi-æruginosa; thorace antice margineque costali basali hemelytrorum miniatescentibus; subtus cum antennis pedibusque nigra, maculis marginalibus et disci utrimque abdominis dilute rufotestaceis. Long. 16, lat. 10 millim. — Mexico.
2. *P. Halys*: flavotestacea, fusco-æruginoso-punctata; scutello basi maculis parvis impunctatis 5; membrana sordide albida, striis parvis brunneis sparsa; subtus parcius punctata, pectore anterieus acervatim parce æruginoso vel metallice viridi-punctato; pedibus fuscopunctatis. Long. 17, lat. 10 millim. — China.

Hæc species Halydibus statura similis.

#### STRACHIA. (HÄHN.)

1. *S. sculpticollis*: sordide lutescens, parce punctata, subtus flavescens; thorace anterieus nonnihil elevato, parte elevata circumpunctata,

bis longitudinaliter et utrimque transversim punctato-imprensa; membrana fuscoviolacescente, antennis, maculis utrimque 3 pectoris lineisque pedum nigris. Long. 11, lat. 6 millim. — Sierra Leona.

EURYSAPSIS. (SIGNOR.)

1. *E. Signoreti*: sordide albidoflavescens, parce subtiliter punctata; scutello pone medium macula nigra, longitudinaliter divisa. Long. 10, lat. 6 millim. — Senegal.

EDESSIDÆ. (DALL.)

EDESSA (FABR.)

1. *E. albidicornis*: olivaceo-testaceæ; antennis flavoalbidis, thorace utrimque cornuto, cornubus thoracis latitudine dimidio brevioribus, crassiusculis, apice clavatis, subuncinatis, nigris; subtus obscurior, abdomine segmento singulo linea obliqua transversa, flava. Long. 17, lat. 9 millim. — Brasilia.
2. *E. Capreola*: olivaceo-flava; antennarum art. 4 apice fusco, (ultimus deest); thorace fasciis 2 mediis virescentibus, viridipunctatis, utrimque longe cornuto, cornubus latitudine thoracis plus dimidio brevioribus, parce nigropunctatis, apice reflexis; scutello pone medium utrimque dilute virescente, apice albido; subtus cum pedibus flavescens, pectore utrimque macula glaucescente. Long. 14, lat. 8 millim. — Brasilia.
3. *E. Bos*: lutescens, nitida; thorace utrimque spinoso, spinis subrecurvis, nigris; hemelytris olivaceo-brunneis; subtus albida, incisuris abdominis vittaque utrimque undata brunnescentibus. Long. 15, lat. 8. — Honduras.

ACERATODES. (AM. & SERV.)

1. *A. flavovirens*: flavescens, rude virescentepunctatus; membrana aureomicans. Long. 18, lat. 10 millim. — Minas Geraes.
2. *A. albomarginatus*: fusco-olivaceus; antennis pedibusque rufotestaceis, illarum art. 2 ultimis flavoalbidis; capite, thorace utrimque hemelytrisque anguste flavomarginatis; subtus testaceus, incisuris abdominis nigris. Long. 19, lat. 10 millim. — Minas Geraes.
3. *A. flavomarginatus*: fusco-olivaceus; antennis, marginibus capitis, lateralibus thoracis, costali basali hemelytrorum abdominisque toto flavoalbidis. Long. 18, lat. 9 millim. — Minas Geraes.

Præcedenti affinis, sed magis rudiusque rugoso-punctatus et obscurior.

SPARTOCERIDÆ. (DALL.)

SPARTOCERA. (LAP.)

1. *S. costicollis*: flavotestacea, parce albidosericea; antennis, capite, thoracis vittis 4 antice confluentibus, postice abbreviatis scutelloque nigrofuscis; thorace utrimque sinuato, posterius utrimque dilatato, disco costis 2 sat elevatis, transversis instructo; scutello basi utrimque albidosericeo; abdomine margine brunneo-maculato; pedibus subserrugineo-fuscis. Long. 16, lat. 7 millim. — Brasilia.

MICTIDÆ. (DALL.)

CRINOCERUS. (BURM.)

1. *C. rubro-ornatus*: niger; capite subtus, rostro, marginibus antico et lateralibus fasciaque thoracis, marginibus hemelytrorum, maculis marginalibus abdominis tibiisque anterioribus rubris. Long. 15, lat. 5 millim. — Brasilia.
2. *C. lugens*: obscure rufoferrugineus, antennis pedibusque anterioribus dilutioribus; thorace posterius fuscopunctato; scutello apice flavo; hemelytris sordide flavotestaceis, rude fuscopunctatis, nervis sat elevatis. Long. 15, lat. 5 millim. — Minas Geraes.
3. *C. subtomentosus*: fuscoferrugineus, parce albidotomentosus; thorace antice, lateribus lineaque media scutelli nigri, margine interno maculaque parva hemelytrorum densius albidotomentosis; subtus sordide lutescens, pectore utrimque maculis 3 nigris. Long. 15, lat. 5 millim. — Patria ignota.

METAPODIUS. (WESTW.)

1. *M. luctuosus*: nigro-ferrugineus; antennarum art. ultimo dilutiore; thorace angulis posticis subdilatatis, acutis, parce granulato; scutelli apice, tibiis tarsisque anticis flavotestaceis; femoribus posticis crassis, subcompressis, granulatis, intus 4-spinosis, spinis 2 mediis majoribus; tibiis posticis utrimque parallele dilatatis. Long. 27, lat. 11 millim. — Mexico.
2. *M. bicoloripes*: nigrofuscus; antennis, pedibus anterioribus scutellique apice imo castaneis; thorace parce granulato, angulis posticis nonnihil dilatatis, subacutis; femoribus posticis apicem versus crassioribus, spinoso-tuberculatis, intus 4-spinosis, tibiis posticis a basi utrimque ampliato-dilatatis, dein medio sinuatis, pone medium intus vix, extus parum dilatatis. Long. 22, lat. 9 millim. — Antiochia Columbiae.

HOMOEOCERIDÆ. (DALL.)

PARYPHES. (SPIN.)

1. *P. lunicollis*: (*Sundarus*. Am. & Serv.) flavotestaceus; antennis art. 2 et 3 fuscis, basi apiceque flavis, (ultimus art. deest.); thorace utrimque valde cornuto, cornubus antrorsum porrectis, intus spinulosus, apice nigrofuscis; scutello nigro, marginibus flavis; hemelytris fuscopunctatis, membrana fusca. Long. 18, lat. 6 millim. — Brasilia.
2. *P. cæsareus*: supra metallice viridis, subtus cum capite flavescens, macula hujus nigrochalybea; thorace antice ruga flava, postice miniato-marginato; pectore utrimque maculis 3, antennis pedibusque nigris. Long. 17, lat. 6 millim. — Patria ignota.
3. *P. amabilis*: dilute olivaceo-flavus; antennis, art. ultimo excepto, lutescentibus; clavo hemelytrorum albido, dense sanguineopunctato, corio apice purpureo-marginato; pectore utrimque linea lutea, abdomine vittis 3 vel 5, tibiisque posticis apice dilute lutescentibus. Long. 17, lat. 6 millim. — Minas Geraes.

ANISOSCELIDÆ. (DALL.)

DIACTOR. (PERTY.)

1. *D. cincticollis*: *D. foliaceo* valde affinis, differt statura angustiore, colore supra brunneo, thorace obscure viridicincto, marginibusque lateralibus anguste flavis. Long. 14, lat. 3½ millim. — Patria ignota.

ANISOSCELIS. (LATR.)

1. *A. vexillatus*: fuscobrunneus; capite testaceo-trilineato; antennis, art. basali excepto, maculis 2 thoracis, fascia angulata hemelytrorum tibiisque anterioribus sordide flavis; subtus flavotestaceus, nigroirroratus; tibiis posticis valde dilatatis, parte dilatata flavomaculata, pone apicem extus bis, intus unisinuata, apice flavis. Long. 19, lat. 7 millim. — Remedios Columbiae.

MICROBASIS. (DALL.)

1. *M.?* *rufiventris*: supra lutea; membrana nigrofusca, basin versus maculis 2 dilutioribus; abdomine rufo, pectore, ano, pedibus, antennarumque art. 1 et 2 (reliqui desunt) nigris. Long. 13, lat. 5 millim. — Sierra Leona.

HYPSELONOTUS. (HAHN.)

1. *H. lineaticollis*: capite, thorace femoribusque testaceis; thorace medio fusco, lineis 2 albidis longitudinalibus; scutello hemelytrisque flavotestaceis; subtus transversim nigrolineatus; antennis tibiisque nigrofuscis, illarum art. 3 et 4 basi albidis. Long. 10, lat. 3½ millim. — Minas Geraes.

Variat hemelytris sordide flavotestaceis, apicem versus dilutioribus.

SERINETHA. (SPIN.)

1. *S. Sinæ*: obscure sanguinea; antennis, scutello, pedibusque nigrofuscis; thorace disco fuscescente; subtus nigrofusca; marginibus maculaque media singuli segmenti abdominis, sanguineis. Long. 13, lat. 3½ millim. — China.

COREIDÆ. (DALL.)

DISCOGASTER. (BURM.)

1. *D. Drewseni*: *D. rhomboideo* affinis, multo angustior; supra flavotestaceus, dense æruginosopunctatus, marginibus lateralibus thoracis, costalique basali hemelytrorum æruginosoviridibus; antennis ferrugineis, art. ultimo fusco, art. 2 et 3 longitudine fere æqualibus; subtus flavus, maculis marginalibus et aliis serie quadruplo positis disci virescentibus; pedibus virescente-flavis. L. 18, l. 5 millim. — Minas Geraes.

CLAVIGRALLA. (SPIN.)

1. *C. pulchra*: thorace, capite subtusque rufa, illo basi spinisque humeralibus nigris; antennis nigris, art. apicali flavo; hemelytris

fuscis; pedibus sordide flavotestaceis, fuscomaculatis. Long. 10, lat.  $3\frac{1}{2}$  millim. — Brasilia.

CECIGENÆ. (AM. & SERV.)

PHYSOPELTA. (AM. & SERV.)

1. *P. bimaculata*: flavotestacea; thorace disco fuscotestaceo, anterius subgibboso, laevi, postice plano, parce punctato; scutello, macula magna apiceque corii, membranaque nigris, hac basi flavotestacea, ibique nigromaculata; pectore fusco; abdominis incisuris anguste nigris. Long. 16, lat. 6 millim. — Java.

LARGUS. (HAHN.)

1. *L. marginicollis*: niger, marginibus lateralibus thoracis hemelytris que rufis, his parce nigropunctatis, vittaque obsoleta nigrofusca ornatis. Long. 13, lat. 5 millim. — Brasilia.
2. *L. morio*: niger; tuberculis antenniferis, antennarumque art. basali basi rufis. Long. 13, lat. 6 millim. — Columbia.

BICELLULI. (AM. & SERV.)

RESTHENIA. (SPIN.)

1. *R. dimidiorufa*: capite, thorace, scutello, basi hemelytrorum pectore que rubris; thorace antice maculis 2, scutello basi maculis 2, hemelytris basi macula 1, pectore utrimque maculis 2 nigris; antennis, hemelytris, basi excepto, abdomine pedibusque nigris. Long. 15, lat. 6 millim. — Brasilia.

CAPSUS. (FABR.)

1. *C. vitripennis*: virescente-flavus; antennis, art. 1 excepto, fuscis; capite thoraceque longitudinaliter rufo-vel ferrugineo-lineatis, hoc etiam linea transversa intramarginali basali nigrofusca; scutelli linea media maculisque 2 apicis brunnescentibus; hemelytris flavohyalinis, nervis obscurioribus; femoribus posticis fuscopunctatis; abdomine utrimque linea longitudinali sanguinea. Long. 8, lat.  $2\frac{1}{2}$  millim. — Java.
2. *C. sobrinus*: præcedenti subaffinis; flavus, thoracis macula magna basin attingente, scutelli macula utrimque media, subferrugineis; hemelytris flavohyalinis, clavo margineque apicali corii obscure sanguineis, subtus dilute sanguineo-fasciatus. Long. 9, lat.  $2\frac{1}{2}$  millim. Java.
3. *C. maculiceps*: supra luteus, subtus cum capite, scutello, antennis pedibusque niger; capite basi maculis 2 albidis, thorace antice, linea humerali parva maculaque triangulari apicali hemelytrorum nigris; membrana fusca. Long. 7, lat. 3 millim. — Gallia meridionalis.
4. *C. thoracatus*: capite, thorace, subtus pedibusque flavus; scutello hemelytris que nigrofuscis; antennis fucis. Long. 6, lat.  $2\frac{2}{3}$  millim. — Java.

5. *C. nitens*: capite, antennis pedibusque sordide flavescentibus; thorace fuscotestaceo, anterius ruga elevata, nitida, fusca; scutello flavotestaceo, angulis dilutioribus; hemelytris flavotestaceis, nitidis, dense punctatis, corio intra marginem fuscopunctato, appendice apice fuscescente; membrana albida, hyalina; subtus nigrofuscus, pectore antice flavotestaceo, ano testaceo; femoribus posterioribus apice fuscomaculatis, tibiis posterioribus fusco-biannulatis. Long. 4, lat. 2 millim. — Gallia meriodonalis.

MIRIS. (FABR.)

1. *M. Hedenborgi*: flava; antennis flavotestaceis; capite lineis 2, thorace lineis 4, scutello lineis 2 ferrugineis; hemelytris obsolete ferrugineo-bi vel tri-lineatis; subtus utrimque vitta intramarginali fuscoferruginea, abdomine medio etiam vittis 2 angustis obsolete-ribus similiter coloratis. Long. 9, lat.  $2\frac{1}{2}$  millim. — Rhodus.

MEMBRANACEI (AM. & SERV.)

TROPIDOCHEILA (FIEBER.)

1. *F. morio*: nigrofusca; thorace disco convexo, longitudinaliter subparallelo 3-carinato, antice vesicula, supra carinata, lateribus sordide flavosericea, instructo. Long. 6, lat.  $1\frac{1}{2}$  millim. — Brasilia.

NUDIROSTRI (AM. & SERV.)

RASAHUS. (AM. & SERV.)

1. *R. flavipes*: flavus; antennarum art. 2 fusco (reliqui desunt.); thorace impressionibus nigrofuscis, postice fuscotestaceo; scutello nigro; hemelytris clavo macula oblonga media, corioque posterioribus fuscobrunnescentibus; membrana, apice excepto, fusca; subtus fuscus, abdomine medio flavotestaceo; margine flavo, fuscomaculato. Long. 21, lat. 4 millim. — Brasilia.

PIRATES. (BURM.)

1. *P. atrox*: nigrofuscus, hemelytris fuscobrunneis, membrana nigrofusca, macula basali flavotestacea; femoribus posterioribus basi, tibiis maculisque marginalibus abdominis flavotestaceis. Long. 17, lat. 5 millim. — Java.

ACANTHASPIS. (AM. & SERV.)

1. *A. flavipes*: nigrofusca; spinis 4 posticis thoracis, basi maculaque apicali hemelytrorum, basi membranæ, maculis marginalibus abdominis pedibusque flavis. Long. 16, lat. 5 millim. — Tranquebar.
2. *A. bimaculata*: nigrofusca; vertice, thorace anterius spinisque 4 posticis, basi hemelytrorum, maculis marginalibus abdominis, annuloque apicali femorum testaceis; macula corii flava. Long. 18, lat. 6 millim. — Java.
3. *A. ornata*. THBG. nigra; thorace angulis posticis acutis, maculis 2 mediis limboque basali, marginibus hemelytrorum, costali pone

medium excepto, margine basali antepectoris abdomineque rubris, hujus maculis marginalibus anoque nigris; membrana dilute fuscescente. Long. 10, lat. 4 millim. — India orientalis?

4. *A. ochropus*: nigra; antennis pedibusque flavotestaceis; macula communi suturali et apicali hemelytrorum sordide flavis; thorace mutico. Long. 12, lat. 4 millim. — Minas Geraes.
5. *A. crudelis*: fuscotestacea; hemelytris nonnihil dilutioribus, membrana maculis pluribus fuscis; antennis, pedibus abdomineque flavotestaceis, hujus margine fuscomaculato; femoribus tibiisque fuscoannulatis. Long. 12, lat. 3½ millim. — Sierra Leona.

#### REDUVIUS. (FARR.)

1. *R. pallidus*: sordide flavescens; capite, fascia pone medium hemelytrorum membranaque, limbo apicali excepto, fuscescentibus. Long. 13, lat. 3½ millim. — Rossia meridionalis.
2. *R. thoracicus*: obscure fuscotestaceus; hemelytris sordide albidis, macula pone medium membranaque, hujus apice maculaque oblonga ad marginem corii exceptis, fuscis; abdomine pedibusque dilute flavotestaceis. Long. 18, lat. 4 millim. — Ins. Rhodus.
3. *R. dorsalis*: nigrofuscus; antennis, hemelytris, postpectore, abdomine pedibusque dilute flavotestaceis; hemelytris macula pone medium ad membranam, membranaque fuscis, hujus apice margineque ad corium flavis; ano fuscescente. Long. 12, lat. 3 millim. — Nubia, circa flumen Bahr-el-Abiad.
4. *R. annulatus*: nigrofuscus; maculis 2 posterioribus confluentibus thoracis, basi apiceque corii, maculis marginalibus abdominis pedibusque dilute flavotestaceis; femorum annulo medio apiceque fuscis. Long. 15, lat. 5 millim. — Sierra Leona.

#### PHYSORHYNCHUS. (AM. & SERV.)

1. *P. crudelis*: luteus; capite, antennis, scutello, hemelytris basi margineque costali basali luteis exceptis, pectore, apice abdominis pedibusque nigris; thorace mox ante medium transversim impresso, impressione longitudinali apicem et basin versus evanescente. Long. 20, lat. 8 millim. — Sierra Leona.
2. *P. lanius*: niger; thoracis angulis posticis maculaque basali, scutelli apice abdomineque rubris, hoc margine supra nigromaculato, subtus segmenti singuli margine anoque nigris; hemelytris fuscis, margine costali lutescente, membrana flavotestacea. Long. 13, lat. 4 millim. — Java.

#### APIOMERUS. (HAHN.)

1. *A. lanius*: niger, sordide flavopilosus; hemelytris, basi excepto, sordide flavescentibus; antepectore abdomineque flavotestaceis, hujus margine anoque nigrofuscis. Long. 22, lat. 7 millim. — Minas Geraes.
2. *A. flavipennis*: niger, flavopilosus (?); hemelytris flavis, membrana hyalina; pedibus fuscopilosis; maculis minutis marginalibus abdominis, femoribus posticis apice, tibiis posticis appendicibusque



analibus flavis, his apice sanguineis. Long. 16, lat. 7 millim. — Columbia.

PRISTESANCHUS. (AM. & SERV.)

1. *P. Afzelii*: obscure chalybeus; thorace, margine postico excepto, scutello, hemelytris pectoreque dense subaureotomentosis; membrana virescente-fusca; abdomine apice flavolimbato; femoribus nigris, posticis basin versus tibiisque flavotestaceis. Long. 29, lat. 8 millim. — Sierra Leona.

HARPACTOR. (LAF.)

1. *H. armipes*: *H. subarmato* (*H. Sch.*) affinis; elongatus, flavo-olivaceus; capite fusco, spinis 6 (2, 2, 2,) armato, anticis 2 longissimis; thorace anterieus fuscescente, disco spinis 4 (2, 2), angulisque posticis singulo spina armatis; hemelytris fuscotestaceis, membrana cupreofusca; femoribus anticis longiusculis, incrassatis, spinoso-tuberculatis, subtus spinis 4, supra apicem versus spina 1, longioribus armatis. Long. 10, lat. 2 millim. — Ins. Taprobana.
2. *H. Hedenborgi*: capite thoraceque nigris, hujus maculis 3 oblongis mediis marginibusque posticis, scutellique apice flavoalbidis; hemelytris dilute fuscescentibus; femoribus luteis, horum annulo medio et apice, tibiisque nigris; abdomine fusco, margine lutescente, nigromaculato. Long. 8, lat. 2 millim. — Ins. Rhodus.

ECCAGORAS. (BURM.)

1. *E. trimaculicollis*: luteus; capite, antennis, maculis 3 transversim positis thoracis, hemelytris, abdomine pedibusque nigris. Long. 18, lat. 4 millim. — Brasilia.
2. *E. nigricornis*: obscure rufotestaceus; capite, basi excepto, antennisque nigris; hemelytris sordide flavotestaceis, pone medium fuscescentibus, corio ante apicem macula oblonga lutea; membrana cupreofusca. Long. 14, lat. 3½ millim. — Minas Geraes.
3. *E.? trux*: fuscotestaceus; capite, antennis, art. basali nigro excepto, pedibusque, femorum apice nigro excepto, rufotestaceis; abdomine nigroviolaceo, pone medium utrimque late flavo. Long. 20, lat. 5 millim. — Sierra Leona.

ISOCONDYLUS. (AM. & SERV.)

1. *I. fuscipes*: flavus; macula intraoculari, thorace posterius, margine basali excepto, hemelytris pedibusque nigrofuscis; thorace posterius spinis 4, mediis 2 longissimis. Long. 14, lat. 3 millim. — Mexico.

ZELUS. (FABR.)

1. *Z. alboannulatus*: niger, nitidus; abdomine ante medium rufo; annulo medio femorum posticorum et obsolete femorum anticorum albidis. Long. 12, lat. 2½ millim. — Remedios Columbiae.

HÆMATOCHARES. (NOV. GEN.)

Caput oblongum, collo breviusculo. Antennæ corpore breviores, æqualiter crassæ, 5-articulatæ, art. 1 brevissimo, capitis apicem non

superante, art. 2 capitis longitudine, 3 hoc plus dimidio brevior, 4 hoc plus ter longior, ultimo hoc parum brevior (?). Thorax antice quam postice dimidio angustior, inermis, medio subconstrictus, angulis posticis rotundatis. Scutellum inerme. Femora antica reliquis nonnihil crassiora; tarsi graciles, mediocres.

1. *H. obscuripennis*: flavotestaceus; capite supra antennisque nigris; hemelytris fuscoviolaceis, basi thoraceque posterioribus lutescentibus; tibiis nigrofuscis. Long. 10, lat.  $2\frac{1}{2}$  millim. — Sierra Leona.

PLOTTERES. (AM. & SERV.)

PTILOMERA. (AM. & SERV.)

1. *P. cingalensis*: supra femoribusque brunnea, opaca; thorace dorso longitudinaliter nitido; macula apicali capitis, antennis, apice rostri, marginibus antico et lateralibus thoracis, horum etiam ramulo parvo, lineis 2 femorum anticorum, tibiis tarsisque nigrofuscis; subtus sordide flavoalbida, dense, brevissime albosericea, pectore utrimque vitta angusta, maculaque apicali mox ante coxas intermedias nigrofuscis, etiam albosericeis. Long. 13, lat. 4 millim. — Ins. Taprobana.

HYDROCORISÆ. (LATR.)

ZAITHA. (AM. & SERV.)

1. *Z. lutaria*: sordide flavotestacea, medio vel mox pone medium latissima; membrana fuscescente, apice limboquo interno sordide albido-hyalinis; antepectore utrimque macula fuscescente; femoribus anticis utrimque maculis 3 nigris; pedibus posterioribus subtus fuscomaculatis. Long. 24, lat. 12 millim. — Patria ignota.

NOTONECTA. (LIN.)

1. *N. australis*: flavoalbida; capite intra oculos longitudinaliter sulcato, medio subgibbo; hemelytris albidohyalinis; abdomine supra basi apicemque versus fuscescente; pectore medio, abdomine femoribusque anterioribus supra nigrofuscis; abdomine ante apicem utrimque longe penicillato-setoso. Long. 13, lat. 4 millim. — Nova Hollandia.

FULGORINA. (BURM.)

APHANA. (BURM.)

1. *A. resima*: sordide flavotestacea; fronte cornuta, cornu recurvo, vertice dupplo longiore, supra sulcato; marginibus lateralibus thoracis anguste nigris; scutello obsolete 3-carinato; hemelytris rufotestaceis, supra dense albidomucoreo-maculatis, maculis costalibus subglaucescentibus; alis nigrofuscis, pone medium flavocinnamomeis, præsertim ante medium albomucoreo-maculatis; abdomine supra albomucoreo. Long. corp. 21, Exp. al. 17 millim. — India orientalis.

POEOCERA. (BURM.)

1. *P. semipellucida*: griseoflavescens; fronte pedibusque fuscomaculatis et irroratis; hemelytris pone medium hyalinis, margine basali, plaga magna obliqua media, vitta pone medium maculisque marginis costali nigrofuscis; alis vitreis; abdomine supra prasino; tibiis anticis basi extus rotundato-dilatatis. Long. corp. 14, exp. al. 39 millim. — Brasilia.
2. *P. rubriceps*: nigra; capite, macula utrimque pectoris, abdomine femoribusque posticis rubris. Long. corp. 11, exp. al. 29 millim. — Brasilia.
3. *P. sepulchralis*: nigra; pectore postice utrimque macula albomucorea; abdomine flavo, subtus medio longitudinaliter nigro. Long. corp. 12, exp. al. 30 millim. — Brasilia.

POECILOPTERA. (LATR.)

1. *P. sobrina*: flava; fronte thoraceque unicarinatis, scutello parallelo 3-carinato; hemelytris angulo suturali apicali acuto, marginibus anguste sanguineis, macula parva suturali pone medium fusca, clavo granulato. Long. corp. 8, exp. al. 24 millim. — Sierra Leona.
2. *P. argiolus*: dilute albidovirescens; fronte, thorace scutelloque, hoc tamen levius, 3-carinatis; hemelytris maculis parvis atosanguineis, obsolete albidocinctis, parce sparsis; clavo granulato. Long. corp. 6, exp. al. 20 millim. — Patria ignota.

DERBE. (FABR.)

1. *D. albicans*: albida; hemelytris alisque albis, nervis transversis dilute fuscescentibus, illis ante apicem macula minuta nigra. Long. corp. 4, exp. al. 20 millim. — Brasilia.
2. *D. furcato-vittata*: fusca; fronte angusta pedibusque flavis; hemelytris albis, hyalinis, apice subglaucescentibus, vitta apice bifurca, a medio ramulum emittente, fusca; alis fuscis; abdomine fulvescente (?). Long. corp. 4, exp. al. 18 millim. — Java.

HÆMISPHERIUS. (SCHAUM.)

1. *H. Schaumi*: sordide flavescens; fronte flavovirescente, vitta media rufa; hemelytris sordide subhyalinis, margine costali antico nigro, macula parva basali suturali, lineisque 2 submediis, subcurvatis, obliquis, flavis. Long. 5, lat. 5 millim. — Ins. Taprobana.

EURYBRACHYS. (GUÉR.)

1. *E. rufiventris*: *E. Bufonis* (Walker) valde affinis videtur; niger, hemelytris macula subtransversa ad marginem costalem ante medium albida, apice intra marginem ferrugineis; postpectore, abdomine femoribusque posticis sanguineis, maculis femorum tibiisque posticis fuscorufescentibus. Long. 6, lat. 4 millim. — Nova Hollandia.

CERCOPIDES. (AM. & SERV.)

MONOCEPHORA. (AM. & SERV.)

1. *M. posticata*: sordide rubra; hemelytris pone medium fuscis, parte fusca basi maculis 2 rubris; scutello, maculis pectoris abdomineque obscure viridiæneis. Long. 15, lat. 7 millim. — Brasilia.

TETTIGONIDES. (AM. & SERV.)

TETTIGONIA. (GEOFFR.)

1. *T. rubrotæniata*: supra sanguinea, subtus cum fronte pedibusque flava; frontis vitta, verticis maculis 5, (3, 2,) (media antica cum frontis vitta confluyente), vittis 4 thoracis, vittisque 3 hemelytrorum nigris. Long. 9, lat. 2 millim. — Honduras.
2. *T. cinctovittata*: lutea, subtus pedibusque dilutior; maculis 3 verticis, 4 thoracis, 2-que basalibus scutelli nigris; hemelytris corio vittis 2, una nigra, altera flava, clavo vittis 2 nigris vittam flavam includentibus. Long. 11, lat. 2½ millim. — Minas Geraes.  
Maculæ 2 basales verticis interdum desunt.
3. *T. Drewseni*: *T. gratiosæ* affinis videtur; lutea; lineolis 5 frontis (quæ interdum desunt), macula apicali<sup>1</sup>, lineis 2 utrimque margineque basali medio verticis, lineolis 2 longitudinalibus, 2 transversis margineque basali thoracis lineolaque transversa scutelli nigris; hemelytris fuscis, maculis minutis flavis dense sparsis, maculaque flava majore suturali ante apicem ornatis; subtus pedibusque flavescens. Long. 8, lat. 2 millim. — Minas Geraes.  
Variat hemelytris commisura vittaque angusta cum macula suturali subapicali confluyente flavis.
4. *T. 6-pustulata*: *T. mutabilis* subaffinis; sanguinea, macula apicali verticis nigra; maculis 2 thoracis 2-que hemelytrorum flavoalbidis; abdomine, ano excepto, fusco; pedibus dilute fuscisanguineis. Long. 10, lat. 2½ millim. — Minas Geraes.
5. *T. suturella*: flavoalbida; maculis, una frontis, 3 verticis, 2 thoracis lineolisque 2 scutelli nigris; hemelytris albopellucidis, commisura margineque costali anguste nigris. Long. 5, lat. 1½ millim. — Manilla.

JASSIDÆ. (AM. & SERV.)

THAMNOTETTIX. (ZETT.)

1. *T. malaya*: virescente-albida, dense subrude punctata; fronte carinata; vertice concavo, carinato; thorace antè subdepresso, ibique bicostato; hemelytris hyalinis, clavo limboque costali rude punctatis; pedibus dilute virescentibus. Long. 7, lat. 1½ millim. — Malacca.
-