

Om *Derbides* med tre oceller. — Studenten C. STÅL
meddelade genom Hr BOHEMAN följande:

»Jag anhåller att i Öfversigten af Kongl. Academiens Förhandlingar erhålla ett rum för följande lilla uppsats, hvars ändamål är att redogöra för en nyligen gjord upptäckt af 3 ocellers förekommande hos några former af underafdelningen *Derbides* bland *Fulgorides*, hvilken sistnämnda utmärkta familj bland andra characterer hittills äfven haft den uppgiften att äga 2 oceller, så snart de ej alldelvis saknas, en belägen på hvardera kinden. Då jag gjorde den omnämnda upptäckten, trodde jag först att ett litet glänsande sandkorn hade blifvit fästadt i spetsen af pannan — der är den tredje ocellen belägen — emedan det ofta händer att dylikå tillfälligtvis vidhäfta insekter, men ett försök att med en nål skrapa bort det misslyckades. Jag kunde likväl ej förlika mig med tanken att det var en ocell, som syntes i pannan, utan fortsatte granskningen af några andra hithörande arter, då jag påträffade ännu tvenne, som företedde samma egenhet, och är nu inget tvifvel att ju det är en ocell. Utom denna egenhet hafva hvardera af de tre arterna tillräckligt många andra för att rätsfärdiga uppstållandet af nya genera, hvaraf det ena är beskrifvit i mitt arbete öfver de af Doctor KINBERG hemförda *Hemipterna*, tvenne beskrivás här nedan och tillägges diagnoser på några andra hörande till denna märkvärdiga familj, hvars arter i allmänhet äro ytterst sällsynta i samlingar.

Då Herr WESTWOOD, som isynnerhet riktat denna grupp med arter och äfven utgifvit en monographi deröfver, ej uppgifvit sig hafva funnit 3 oceller hos någon enda, kan jag ej tro annat än att denna annars så noggranne forskare måste hafva översett dem, då det knappt är tänkbart, att 3 arter bland det lilla antal, som äro kända af mig, skulle kunnat förete nämnde egenhet och Herr WESTWOOD, som beskrifver fyra gånger så många som jag känner, icke skulle hafva påträffat en enda så beskaffad.

Då jag här talat om en grupp bland *Fulgorides*, begagnar jag tillfället att nämna några ord om *Delphacides*, som äfven höra dit. De flesta författare hafva lemnat dessa djur en i mitt tycke alltsör underordnad rang, då de blott deraf gjort en afdelning under *Cixiides*, och de enda som uppställt dem såsom egen subfamilia under *Fulgorides* hafva gjort det på grund af den mindre goda characteren af ett längdsförhållande mellan en kroppsdel och en annan. Mig tyckas *Delphacides* böra utgöra en egen afdelning bland *Fulgorides*, med lika rang som *Cixiides*, etc., och äro de bäst characteriserade och straxt igenkända på den fria, långa, ofta lancettlika sporre som är infogad i sjelfva spetsen af baktibierna, en character som Markis SPINOLA antydt, men ej tillagt den vigt, som den förtjenar.

Här följa beskrifningarne på de nya slägtena och arterna af *Derbides*.

BRIXIA. STÅL.

Caput supra visum ante oculos nonnihil productum, vertice fronteque' alte marginatis, illo elongato-triangulari, angusto, hac oblonga, basin versus inter oculos valde compressa, marginibus lateralibus hic contiguis; labro elongato-triangulari, compresso, carinato-marginato, longitrorsum unicarinato.

Oculi sat profunde sinuati.

Ocelli tres! unus in singula gena mox ante oculum, tertius in frontis apice ad labrum situs.

Antennæ oculis æquilongæ, cylindricæ, prope marginem inferiorem anticum oculorum sitæ.

Thorax brevis, postice angulato-sinuatus.

Tegmina latitudine $1\frac{1}{2}$ longiora, apicem versus sensim nonnihil latiora, apice rotundata, nervis longitudinalibus, omnibus apicem versus, intermedii etiam disco a nervis transversis semel conjunctis, nonnullis apice furcatis.

Alæ amplæ, latæ.

Pedes mediocres, tibiis posticis inermibus.

1. *B. natalicola*. Sordide testaceo-flava, maculis marginalibus verticis fuscis; tegminibus sordide hyalinis, macula costali media limboque apicali fuscescentibus, nervis utrinque sabalternatim fusco-punctatis. ♂.
Long. corp. $3\frac{1}{2}$, Exp. al. 12 millim.

Derbe natalicola. STÅL. Öfv. af K. Vet.-Akad. Förh. 1855, p. 93. 2.

Patria: Caffraria. Dom. J. A. WAHLBERG. Mus. Holmiense.

Genus hocce quoad structuram capitidis *Phenice*, quoad elytrorum *Mytidæ* subaffine.

ADANA. STÅL.

Caput latum, supra visum ante oculos quadrato-productum, latitudine nonnihil brevius, apicem versus nonnihil latius; vertice brevi, transverso, a

fronte per carinam arcuatam separato; fronte (capite supra viso) ante verticem producta, dein subito reclinato-decliva, et (ab antico visa) cum labro triangulari et reflexo-marginata, illa latitudine subbreviore, longitrorum carinata; genis latiusculis.

Oculi anterius sinuati.

Ocelli tres!, unus in singula gena mox ante marginem superiorem oculorum situs, tertius in frontis apice prope labrum.

Thorax brevissimus.

Tegmina latitudine vix $1\frac{1}{2}$ longiora, apicem versus nonnihil latiora, apice oblique rotundata, nervis longitudinalibus, intermediis disco et apicem versus a nervis transversis semel conjunctis, nonnullis furcatis.

Alæ amplæ, latæ.

Pedes mediocres, tibiis posticis inermibus.

1. *A. Westwoodi*. Flavo-testacea, tegminibus alisque sordide hyalinis, illis maculis pluribus fuscescentibus, hic illic confluentibus, maculaque costali media nigro-fusca ornatis, his apice et intus fuscescentibus. ♂.
Long. corp. 3, Exp. al. 10 millim.

Patria: Mexico. Dom. HÖGBERG. Mus. Holm.

Hanc speciem generis valde singularis nomine Cel. Dom. J. O. Westwood, qui horum animalculorum monographiam eximiam elaboravit, ornare volui.

PHENICE. WESTW.

1. *P. furcato-vittata*. Fusco-testacea; vertice, fronte valde compressa, antennis pedibusque pallide flavo-albidis; tegminibus hyalinis, vitta lassisima apicem versus furcata, medio ramulum emitente, fusca ornatis, apice glaucescente-subsarinosis; alis fuscis, limbo inter nervos dilutiore. ♂.
Long. corp. 4, Exp. al. 13 millim.

Derbe furcato-vittata. STÅL. Öfv. af K. Vet.-Acad. Förh. 1855, p. 191, 2.

Patria: Java. Dom. MELLERBORG. Mus. Holm.

Caput hujus speciei magis compressum, quam apud congenericas tres africanas a Dom. BOHEMAN descriptas.

MYSIDIA WESTW.

1. *M. albicans*. Subflavo-albida; tegminibus alisque albidis, illorum nervis transversis, maculis parvis duabus basin versus prope costam maculaque parva clavi fuscescentibus; macula apicem versus nigro-fusca. ♂.
Long. 4, Exp. al. 18 millim.

Derbe albicans. STÅL. Öfv. af K. Vet.-Acad. Förh. 1855, p. 191, 1.

Patria: Brasilia. Mus. Holm.

Valde affinis videtur *M. lactifloræ*.

PHRYGIA. STÅL.

Caput latum, supra visum ante oculos vix productum, vertice a fronte haud separato; fronte quadrata, leviter reflexo-marginata, unicarinata; labro triangulari, lateribus et medio carinato.

Antennæ brevissimæ.

Oculi subglobosi, subtus levissime sinuati.

Ocelli duo, unus in singula gena mox ante oculorum marginem inferiorem.

Thorax brevis.

Tegmina latitudine $1\frac{1}{2}$ longiora, apice rotundata, nervis longitudinalibus, omnibus apicem versus, intermediis etiam disco, a nervis transversis semel conjunctis, uno alterove furcato.

Alæ amplæ.

Pedes mediocres, tibiis posticis inermibus.

1. *P. fuscata*. Obscure fusco-testacea, tegminibus alisque fusco-testaceo-hyalinis, illis maculis nonnullis dilutioribus; antennis pedibusque flavo-testaceis, femoribus posticis obscurioribus. ♂. Long. corp. 4, Exp. al. 11 millim.

Patria: Brasilia. Mus. Holm.

HELCITA. STÅL.

Hoc genus novum quoad structuram tegminum *Thraciæ* et *Phenice* affine, quoad antennas et oculos cum *Phenice*, quoad defectum ocellorum et formam capitis magis cum *Thracia* congruit, sed capite ante oculos valde nasuto-producto gaudet. Ampliorem hujus generis descriptionem in opere de *Hemipteris Caffrariae* dare volo. Typus generis est *Derbe Wahlbergi, mihi.*»
